



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 25 - 06 -2007

Αριθ.Πρωτ.:119997

**Ταχ.Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος
Τηλέφωνο: 210 928 7219**

**ΘΕΜΑ: “Κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής
των σκευασμάτων ABATE 1SG,
ABATE 50 EC, TEMEΦΩΣ-
ΥΨΙΛΟΝ 50EC, DU-DIM 10WP,
DU-DIM 15SC, DU-DIM 2 GR,
VECTOBAC και Bacillus
thuringiensis subsp. israelensis-
ISAGRO Biofarming σε υδάτινες
επιφάνειες με καλλιέργειες ρυζιού
για το έτος 2007.”**

ΠΡΟΣ:

- 1. BASF AGRO HELLAS SA
Αγιαλείας 48, Παράδεισος
15125 Μαρούσι - ΑΘΗΝΑ
(Με απόδειξη)**
- 2. CROMPTON EUROPE B.V.
Ankerweg 18,
1041 AT Amsterdam (Ολλανδία)
(Διά του Κ. Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. Γούναρη 4,
546 21, Θεσ/νίκη)
(Με απόδειξη)**
- 3. ΥΨΙΛΟΝ ΑΕ
Δ. Γληνού 32,
542 49, Θεσ/νίκη
(Με απόδειξη)**
- 4. ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΕΠΕ
Δυρραχίου 70,
104 43, ΑΘΗΝΑ
(Με απόδειξη)**

ΚΟΙΝ:

- 1. Γραφείο κ. Υπουργού**
- 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού**
- 3. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά.**
- 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ**
- 5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με email)
Έδρες τους**
- 6. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά (με email)**
- 7. Περιφερειακά Κέντρα
Προστασίας Φυτών και
Ποιοτικού Ελέγχου
Έδρες τους (με email)**

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το άρθρ. 16.
2. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 26 παρ. α (γγ).
3. Τη με αριθ. 2007/70/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής «σχετικά με την παράταση της προθεσμίας για τη διάθεση στην αγορά βιοκτόνων τα οποία περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες που δεν έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο του δεκαετούς προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ»
4. Τη γνωμοδότηση για το 1^ο θέμα της 5^{ης}/08-06-2007 Συνεδρίασης του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.
5. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (ΦΕΚ 1533/Β/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό”.
6. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ια. Χορηγούμε κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής για το έτος 2007 στα παρασιτοκτόνα υγειονομικής σημασίας ABATE 1 SG, ABATE 50 EC και ΤΕΜΕΦΩΣ-ΥΨΙΛΟΝ 50EC, (με δρων συστατικό temephos), των εταιρειών BASF AGRO HELLAS SA και ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., επιπλέον των εγκεκριμένων εφαρμογών, που καθορίζονται στις εγκρίσεις κυκλοφορίας τους, και σε υδάτινες επιφάνειες με καλλιέργειες ρυζιού, ως ακολούθως:

A) ABATE 1SG

Πεδίο εφαρμογής	Εχθροί	Δόσεις (gr/στρέμμα)	Τρόπος εφαρμογής
Ορυζώνες σε κατάκλιση	Κουνούπια στο στάδιο της προνύμφης	500 – 1000 Ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των προνυμφών και την ένταση της προσβολής. Η χαμηλή δόση για μικρής έντασης προσβολή και προνύμφες 1 ^{ου} ή 2 ^{ου} σταδίου και μεγαλύτερες δόσεις για μεγάλης έντασης προσβολή και προνύμφες 3 ^{ου} ή 4 ^{ου} σταδίου και στο στάδιο της νύμφης.	α. Από εδάφους β. Από αέρος

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: πέντε (5)

Μεσοδιάστημα Εφαρμογών : 14 ημέρες

Τελευταία Ασφαλή Επέμβαση: 2 μήνες πριν από τη συγκομιδή του ρυζιού

B) ABATE 50 EC

Πεδίο εφαρμογής	Εχθροί	Δόσεις (κυβ.εκ./στρέμμα)	Τρόπος εφαρμογής
Ορυζώνες σε κατάκλιση	Κουνούπια στο στάδιο της προνύμφης	15 – 20 Ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των προνυμφών και την ένταση της προσβολής. Η χαμηλή δόση για μικρής έντασης προσβολή και προνύμφες 1 ^{ου} ή 2 ^{ου} σταδίου και μεγαλύτερες δόσεις για μεγάλης έντασης προσβολή και προνύμφες 3 ^{ου} ή 4 ^{ου} σταδίου και στο στάδιο της νύμφης.	α. Από εδάφους β. Από αέρος

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: πέντε (5)

Μεσοδιάστημα Εφαρμογών : 14 ημέρες

Τελευταία Ασφαλή Επέμβαση: Τέλος μηνός Ιουλίου 2007

Γ) ΤΕΜΕΦΩΣ-ΥΨΙΛΟΝ 50 EC

Πεδίο εφαρμογής	Εχθροί	Δόσεις (κυβ.εκ./στρέμμα)	Τρόπος εφαρμογής
Ορυζώνες σε κατάκλιση	Κουνούπια στο στάδιο της προνύμφης	15 – 20 Ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των προνυμφών και την ένταση της προσβολής. Η χαμηλή δόση για μικρής έντασης προσβολή και προνύμφες 1 ^{ου} ή 2 ^{ου} σταδίου και μεγαλύτερες δόσεις για μεγάλης έντασης προσβολή και προνύμφες 3 ^{ου} ή 4 ^{ου} σταδίου και στο στάδιο της νύμφης.	α. Από εδάφους β. Από αέρος

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: πέντε (5)

Μεσοδιάστημα Εφαρμογών : 14 ημέρες

Τελευταία Ασφαλή Επέμβαση: Τέλος μηνός Ιουλίου 2007

Ιβ. Χορηγούμε κατ' εξαίρεση άδεια εφαρμογής για το έτος 2007 στα παρασιτοκτόνα υγειονομικής σημασίας VECTOBAC της εταιρείας BASF AGRO HELLAS SA, και *Bacillus thuringiensis subsp. israelensis*-ISAGRO Biofarming της εταιρείας ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΕΠΕ (με δρών συστατικό το *Bacillus thuringiensis subsp. israelensis*) και για χρήση σε υδάτινες επιφάνειες με καλλιέργειες ρυζιού ως ακολούθως:

A. VECTOBAC

Επιπλέον των εγκεκριμένων εφαρμογών που καθορίζονται στην προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας, επιτρέπεται η χρήση του για το έτος 2007 και ως ακολούθως:

Πεδίο εφαρμογής	Εχθροί	Δόσεις (κυβ.εκ./στρέμμα)	Τρόπος εφαρμογής
Ορυζώνες σε κατάκλιση	Κουνούπια στο στάδιο της προνύμφης	80 – 200 Ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των προνυμφών, την ένταση της προσβολής τη θερμοκρασία του νερού και την περιεκτικότητα του υδάτινου όγκου σε οργανική ουσία.	α. Από εδάφους β. Από αέρος

		Η χαμηλή δόση για μικρής έντασης προσβολή, προνύμφες 1^{ου} ή 2^{ου} σταδίου, υψηλή θερμοκρασία νερού και χαμηλή περιεκτικότητα του νερού σε οργανική ουσία και μεγαλύτερες δόσεις για μεγάλης έντασης προσβολή, προνύμφες 3^{ου} ή 4^{ου} σταδίου, χαμηλή θερμοκρασία νερού και υψηλή περιεκτικότητα του νερού σε οργανική ουσία.	
--	--	---	--

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: ----

Μεσοδιάστημα Εφαρμογών: Η εφαρμογή επαναλαμβάνεται όταν στα νερά εμφανισθούν και πάλι προνύμφες.

Τελευταία Ασφαλή Επέμβαση: Τρεις ημέρες πριν από τη συγκομιδή.

B. *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis*-ISAGRO Biofarming

Πεδίο εφαρμογής	Εχθροί	Δόσεις (κυβ.εκ./στρέμμα)	Τρόπος εφαρμογής
Ορυζώνες σε κατάκλιση	Κουνούπια στο στάδιο της προνύμφης	40 – 170 Ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των προνυμφών, την ένταση της προσβολής τη θερμοκρασία του νερού και την περιεκτικότητα του υδάτινου όγκου σε οργανική ουσία. Η χαμηλή δόση για μικρής έντασης προσβολή, προνύμφες 1^{ου} ή 2^{ου} σταδίου, υψηλή θερμοκρασία νερού και χαμηλή περιεκτικότητα του νερού σε οργανική ουσία και μεγαλύτερες δόσεις για μεγάλης έντασης προσβολή, προνύμφες 3^{ου} ή 4^{ου} σταδίου, χαμηλή θερμοκρασία νερού και υψηλή περιεκτικότητα του νερού σε οργανική ουσία.	α. Από εδάφους β. Από αέρος

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: ----

Μεσοδιάστημα Εφαρμογών: Η εφαρμογή επαναλαμβάνεται όταν στα νερά εμφανισθούν και πάλι προνύμφες.

Τελευταία Ασφαλή Επέμβαση: Τρεις ημέρες πριν από τη συγκομιδή.

Ιγ. Χορηγούμε κατ' εξαίρεση άδεια εφαρμογής για το έτος 2007 στα παρασιτοκτόνα υγειονομικής σημασίας DU-DIM 10 WP, DU-DIM 15 SC και DU-DIM 2 GR (με δρων συστατικό diflubenzuron) της εταιρείας CROMPTON EUROPE B.V. (υπεύθυνος επικοινωνίας στη χώρα μας κος Κ.Σ. Παπαδόπουλος), επιπλέον των εγκεκριμένων εφαρμογών, που καθορίζονται στις εγκρίσεις κυκλοφορίας τους, και σε υδάτινες επιφάνειες με καλλιέργειες ρυζιού ως ακολούθως:

A) DU-DIM 10 WP

Πεδίο εφαρμογής	Εχθροί	Δόσεις g/στρ	Τρόπος εφαρμογής
Ορυζώνες σε κατάκλιση	Κουνούπια στο στάδιο της προνύμφης	50 γρ σκευάσματος /10L νερού /στρέμμα	α. Από εδάφους β. Από αέρος

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: -τέσσερις (4)

Μεσοδιάστημα Εφαρμογών: 15 ημέρες

Τελευταία Ασφαλή Επέμβαση: 35 ημέρες πριν από τη συγκομιδή

B) DU-DIM 15 SC

Πεδίο εφαρμογής	Εχθροί	Δόσεις	Τρόπος εφαρμογής
Ορυζώνες σε κατάκλιση	Κουνούπια στο στάδιο της προνύμφης	35 κ.εκ. σκευάσματος /10L νερού /στρέμμα	α. Από εδάφους β. Από αέρος

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: -τέσσερις (4)

Μεσοδιάστημα Εφαρμογών: 15 ημέρες

Τελευταία Ασφαλή Επέμβαση: 35 ημέρες πριν από τη συγκομιδή

Γ) DU-DIM 2 GR

Πεδίο εφαρμογής	Εχθροί	Δόσεις	Τρόπος εφαρμογής
Ορυζώνες σε κατάκλιση	Κουνούπια στο στάδιο της προνύμφης	250g σκευάσματος /10L νερού /στρέμμα	α. Από εδάφους β. Από αέρος*

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: -τέσσερις (4)

Μεσοδιάστημα Εφαρμογών: 15 ημέρες

Τελευταία Ασφαλή Επέμβαση: 35 ημέρες πριν από τη συγκομιδή

IIα. Η εφαρμογή των σκευασμάτων θα γίνεται υπό την ευθύνη-εποπτεία και καθοδήγηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Δ/νσεις Γεωργίας σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Υγιεινής) λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή εφαρμογή τους. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα συλλέξουν ένα δείγμα ρυζιού ανά χίλια (1000) στρέμματα στις περιοχές που έγινε εφαρμογή των παραπάνω σκευασμάτων και θα τα αποστείλουν στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για ανάλυση υπολειμμάτων. Επίσης, θα υποβάλουν στη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής έκθεση για τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή των παραπάνω σκευασμάτων.

IIβ Σε περίπτωση που η διενέργεια αεροψεκασμών κρίθει ως αναγκαία (π.χ. αδυναμία προσέγγισης των εστιών από ξηρά) πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

- Πριν από την εφαρμογή των αεροψεκασμών να γίνεται χαρτογράφηση των περιοχών, εντοπισμός των εστιών ανάπτυξης κουνουπιών και δειγματοληπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση της παρουσίας προνυμφών.
- Διενέργεια αεροψεκασμών μόνο όταν οι συνθήκες (καιρικές, περιοχή ελεύθερη από ανθρώπους ή ζώα κ.α.) το επιτρέπουν.
- Σωστός υπολογισμός της δοσολογίας ώστε στη ψεκαζόμενη υδάτινη επιφάνεια να φτάνει πάντα η εγκεκριμένη ποσότητα δραστικής ουσίας.
- Να γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων σε διάφορα στάδια του ετήσιου προγράμματος καταπολέμησης για έγκαιρη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

III. Οι εταιρείες BASF AGRO HELLAS SA, ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., CROMPTON EUROPE B.V. (υπεύθυνος επικοινωνίας στη χώρα μας κος Κ.Σ. Παπαδόπουλος), και ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΕΠΕ **υποχρεούνται:**

- α) να ενημερώνουν τη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τις ποσότητες και τις περιοχές που θα χρησιμοποιούνται τα εν λόγω σκευάσματα κατά την περίοδο της

εφαρμογής τους και να αναφέρουν την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων όπως και κάθε παρατήρηση για δυσμενείς επιπτώσεις και φαινόμενα που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω κατ' εξαίρεση άδεια εφαρμογής τους.

β) να προσκομίσουν στην Υπηρεσία τις μεθόδους ανάλυσης για τα υπολείμματα όλων των παραπάνω σκευασμάτων καθώς και τα αντίστοιχα αναλυτικά standards.

γ) να αναλάβουν την οικονομική δαπάνη (δειγματοληψία και μεταφορά στο Μ.Φ.Ι) για την ανάλυση των δειγμάτων (σε ότι αφορά υπολείμματα στην καλλιέργεια ρυζιού) τα οποία θα συλλεχθούν από τις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

IV. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων όπως και τις τυχόν παρενέργειές των ABATE 1 SG, ABATE 50 EC και VECTOBAC ανήκει στην εταιρεία BASF AGRO HELLAS SA, του ΤΕΜΕΦΩΣ-ΥΨΙΛΟΝ 50 EC στην εταιρεία ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., των DU-DIM 10 WP, DU-DIM 15 SC και DU-DIM 2 GR στην εταιρεία CROMPTON EUROPE B.V. (υπεύθυνος επικοινωνίας στη χώρα μας κος Κ.Σ. Παπαδόπουλος) και του Bacillus thuringiensis subsp. israelensis-ISAGRO Biofarming στην εταιρεία ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΕΠΕ.

**Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ