



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 21-01-2019
Αριθ. πρωτ: 780/11757**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 210 928 7237
e-mail: apapamichail@minagric.gr**

**Προς: BASF Ελλάς ABEE
Παραδείσου 2 & Κηφισίας
Τ.Κ. 15125, Μαρούσι
e-mail: dimitris.theodosiou@basf.com**

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. 60.714 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ACROBAT M WG (δ.ο. mancozeb 60% β/β, dimethomorph 9% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας»
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Τις υπ' αρ. 11236/129246/24-11-2015 και 7781/103237/23-07-2018 αιτήσεις της εταιρείας BASF Ελλάς ABEE και το υπ' αρ. 6943/93473/2-7-2018 έγγραφο της εταιρείας INDOFIL INDUSTRIES LIMITED.
7. Την από 25 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ACROBAT M DG από την Αρμόδια Αρχή της Γαλλίας (AMM n° 9600103), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την σχετική Αξιολόγηση από την ΑΑΑ της Γαλλίας (ANSES OPINION) η οποία απεστάλη στην υπηρεσία μας με το υπ' αρ. 3237/37965/29-3-2016 διαβιβαστικό έγγραφο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθ. **60.714** οριστική έγκριση διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**μυκητοκτόνο**) **ACROBAT M WG (δ.ο. mancozeb 60% β/β, dimethomorph 9% β/β)** που χορηγήθηκε με την με αριθ. **7781/103237/22-11-2018** απόφαση μας ως προς το φάσμα δράσης (επέκταση σε χρήσεις ήσσονος σημασίας) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5		Φάσμα δράσης				Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	
		γρ./στρέμμα	γρ. / 100 λίτρα υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (VITVI) (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο)	<u>Περονόσπορος</u> <i>(Plasmopara viticola, PLASVI)</i> <u>Μαύρη Σήψη</u> <i>(Guignardia bidwellii, GUIGBI)</i>	250	250	100	Εφαρμόστε προστατευτικά όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών (ακολουθήστε τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων). Κάνετε εφαρμογές με μεσοδιάστημα ως 14 ημέρες, προσαρμόζοντας ανάλογα με την ανάπτυξη της καλλιέργειας και την πίεση προσβολής. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης προσβολής ή έντονης βλαστητικής ανάπτυξης του αμπελιού, το μεσοδιάστημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 12 ημέρες.	2 /12-14 ημέρες.

<p>Ασκαλώνιο (ALLAS)</p> <p>Κρεμμύδι (ALLCE) (υπαίθρου)</p>	<p><u>Περονόσπορος</u> (<i>Peronospora destructor</i>, <i>PERODE</i>)</p>	200	200	100	<p>Εφαρμόστε από το στάδιο των 4 φύλλων και επαναλάβετε με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών σε εναλλαγή με προϊόντα με διαφορετικό τρόπο δράσης.</p>	3/7-10 ημέρες.
<p>Μαρούλι (LACSA) (υπαίθρου)</p>	<p><u>Περονόσπορος</u> (<i>Bremia lactucae</i>, <i>BREMLA</i>)</p>	160	160	100	<p>Εφαρμόστε από την ανάπτυξη της καλλιέργειας</p>	3
<p>Πεπόνι (CUMME) (υπαίθρου)</p>	<p><u>Περονόσπορος</u> (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>, <i>PSPECU</i>)</p>	200	200	100	<p>Εφαρμόστε προστατευτικά όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Το μεσοδιάστημα μεταξύ δύο εφαρμογών είναι 7-10 ημέρες, ανάλογα με την πίεση προσβολής της ασθένειας.</p>	3/7-10 ημέρες
<p>Πατάτα (SOLSS) (υπαίθρου)</p>	<p><u>Περονόσπορος</u> (<i>Phytophthora infestans</i>, <i>PHYTIN</i>)</p> <p><u>Αλτερνάρια</u> (<i>Alternaria alternata</i>, <i>ALTEAL</i>, <i>Alternaria solani</i>, <i>ALTESO</i>)</p>	200	-	50-100	<p>Εφαρμόστε προστατευτικά όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Προστατεύει το φυτό κατά την ανάπτυξη.</p> <p><u>Περονόσπορος</u>: επαναλάβετε κάθε 7 ημέρες. Σε περίπτωση ήπιας πίεσης προσβολής και όταν η βλάστηση έχει σταθεροποιηθεί, δηλαδή κατά την άνθιση, το</p>	3/7-10 ημέρες

					μεσοδιάστημα μπορεί να επιμηκυνθεί στις 10 ημέρες. <u>Αλτερνάρια:</u> επαναλάβετε ανά 7 ως 10 ημέρες, ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου.	
Πράσο ⁽⁴⁾ (ALLPO) (υπαίθρου)	<u>Περονόσπορος</u> (<i>Phytophthora porri</i> , ΡΗΥΤΡΟ)	200	250-400	50-80	Εφαρμογές κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.	2/14-21 ημέρες.
Αρακάς (χωρίς λοβό) (PIBSX) (υπαίθρου)	<u>Περονόσπορος</u> (<i>Peronospora pisi</i> , ΡΕΡΟVP)	200	500-100	20-40	Εφαρμόστε προστατευτικά όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, που μπορεί να ξεκινά 30 με 40 ημέρες μετά τη σπορά. Επαναλάβετε την εφαρμογή με μεσοδιάστημα 7 ως 10 ημερών αν ο κίνδυνος του περονόσπορου είναι αυξημένος, εναλλάσσοντας με προϊόντα με διαφορετικό τρόπο δράσης.	2/7-10 ημέρες.
Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι (χρήση ήσσονος σημασίας)	<u>Περονόσπορος</u> (<i>Peronospora destructor</i> , ΡΕΡΟDE)	250	250	100	Εφαρμόστε προστατευτικά όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	2 / 7-10 ημέρες.
Υπνοφόρος Παπαρούνα (PAPSO) (χρήση ήσσονος σημασίας)	<u>Περονόσπορος</u> (<i>Peronospora destructor</i> , ΡΕΡΟDE)	200	200	100	Εφαρμόστε προστατευτικά όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, από τα 2-4 φύλλα, έως και το τέλος της ανάπτυξης των	2

					στελεχών.	
Φυτά για σποροπαραγωγή ή Λαχανικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικώ ν Φυτών (χρήση ήσσονος σημασίας)	Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i> , <i>PERODE</i>)	200	200	100	Εφαρμόστε προστατευτικά όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	3 /7-10 ημέρες
Τριαντάφυλλο (ROXU) (Υ + Θ) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i> , <i>PERODE</i>)	250	250	100	Εφαρμόστε προστατευτικά όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	2 / 7-10 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

- Αμπέλι:** Να μην χρησιμοποιείται τα αμπελόφυλλα ως τροφή σε περίπτωση χρήσης του ACROBAT M WG.
- Αμπέλι:** Να μη γίνονται περισσότερες από 2 εφαρμογές με ACROBAT M WG ή σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες με όμοιο τρόπο δράσης. Θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα σε ένα πρόγραμμα ψεκασμού:
 - Να μη γίνονται συνεχόμενες εφαρμογές.
 - Να κάνετε προληπτικές εφαρμογές.
 - Να μην είναι το τελευταίο σκεύασμα στο πρόγραμμα ψεκασμού.
- Η ποιότητα του ψεκαστικού νέφους (ομοιογενής κατανομή του ψεκαστικού διαλύματος) και οι μετεωρολογικές συνθήκες κατά τον ψεκασμό (θερμοκρασία < 25°C και υγρασία > 70%) συμμετέχουν στην επιτυχία της εφαρμογής. Υπό συνθήκες μεγάλης ζέστης (>25°C) κάνετε τις εφαρμογές νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ.
- Χρήσεις ήσσονος σημασίας:** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αυτές, από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις καλλιέργειες αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
- Υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν ίχνη λεκέδων από τη χρήση του σκευάσματος. Για το λόγο αυτό:
 - Για τα τριαντάφυλλα των οποίων τα άνθη θα κοπούν, μην εφαρμόζετε το σκεύασμα στην περίοδο άνθισης ούτε στην περίοδο παραγωγής των βλαστών.
 - Για τα τριαντάφυλλα που θα πωληθούν με τις γλάστρες τους, μην εφαρμόζετε για ένα μήνα πριν την πώληση τους.

13**Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	28
Ασκαλώνιο	28
Μαρούλι	28
Πεπόνι	3

Κρεμμύδι	28
Πατάτα	7
Πράσο	14
Αρακάς (χωρίς λοβό)	21
Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι, Φυτά για σποροπαραγωγή Λαχανικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών	Μη εφαρμόσιμο
Υπνοφόρος Παπαρούνα	60
Τριαντάφυλλο	Μη εφαρμόσιμο

B

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 7781/103237/22-11-2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ**