



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 27 - 8 - 2015  
Αριθ. 3831/45026  
πρωτ:

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 928 7161  
e-mail: [chpanagoroulou@minagri.c.gr](mailto:chpanagoroulou@minagri.c.gr)

Προς: Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Σωρού 18-20  
Τ.Κ.151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

E-mail: [ioannis.tsoutsanis@bayer.com](mailto:ioannis.tsoutsanis@bayer.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 6174 οριστικής έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ANTRACOL 70 WP ως προς το φάσμα δράσης (χρήση ήσσονος σημασίας)»

### ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

### ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
3. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»

5. Την αξιολόγηση του ΜΦΙ
6. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας
7. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
8. Τη με αριθ. Πρωτ. . 6252/78481(ΦΕΚ 1503/Β/17.07.2015)) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Την από 19-11--2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 6174 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος(μυκητοκτόνο) **ANTRACOL 70 WP** (δ.ο. prorineb), που χορηγήθηκε με την με. αριθ. **127236/16-3 – 2009** απόφαση μας ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

#### Συγκεκριμένα

##### Α. Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5	5.1 Φάσμα δράσης					Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο **
	Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος				
Γρ./ Στρέμμα			Γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/ στρέμμα			
Μηλιά - *	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis</i> ) ( <i>Venturia pyrina</i> )	120-225	150	80-150	Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος πριν από την άνθηση και ένας μετά από την άνθηση	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-21 ημέρες	
-Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα ποικιλίες)	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Plasmopara viticola</i> )	120-200	200	60-100	Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος πριν και δύο μετά την άνθηση.*	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.	

-Τομάτα (Υπαίθρου)	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )  <b>Αλτερναρίωση</b> ( <i>Alternaria solani</i> )	120-250 (Υ)	200-250	60-100 (Υ)	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος .	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
Τομάτα (θερμοκηπίου)	<b>Κλαδοσπορίωση</b> ( <i>Cladosporium spp.</i> )	120-300 (Θ)	200-250	60-120 (Θ)		
-Αγγούρι (Θερμοκηπίου)	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	200-250	200-250	100-120***	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος .	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
-Πατάτα	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )  <b>Αλτερναρίωση</b> ( <i>Alternaria solani</i> )	200-250	-	50-100	Προληπτικοί Ψεκασμοί φυλλώματος .	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.
-Πεπόνι -Καρπούζι	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	200-250	200-250	100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος .	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες.
-Καπνός	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Peronospora tabacina</i> )	200	200	100 (σπορείο)	Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος στα σπορεία.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
				80-240 (μετά τη μεταφύτευση)	Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος μετά τη μεταφύτευση.	+2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
Καλλωπιστι	<b>Περονόσπορος</b>	200	200	100	Προληπτικοί	-

κά	<p>ς (<i>Peronospora spp.</i>)</p> <p><b>Σκωρίαση</b> (<i>Uromyces spp.</i>)</p>				ψεκασμοί φυλλώματος	
Χρήση ήσσονος σημασίας Ρόκα (Υ)	<p><b>Περονόσπορος</b> <i>Albugo candida</i> (ALBUCA), <i>Peronospora</i> <i>parasitica</i> (PEROPA), <i>Plasmopara</i> <i>nivea</i> (PLASCR)</p>	120-250 (Υ)	200-250	60-100 (Υ)	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες
Ρόκα (Θ)		120-300 (Θ)	200-250	60-120 (Θ)		
Χρήση ήσσονος σημασίας	<p><b>Περονόσπορος</b> <i>Peronospora spp.</i> (PEROSP), <b>Αλτερνάρια</b> <i>Alternaria spp.</i> (ALTESP) <b>Κλαδοσπόριο</b> <i>Cladosporium spp.</i> (CLADSP)</p>	120-250 (Υ)	200-250	60-100 (Υ)	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος	
Αρωματικά φυτά (φασκόμηλο, δεντρολίβαν ο, θυμάρι, μαντζουράν α, ρίγανη, βασιλικός, δύσμος, μέντα, φύλλα δάφνης, εστραγκόν) (Υ)		120-300 (Θ)	200-250	60-120 (Θ)		
Αρωματικά φυτά (φασκόμηλο, δεντρολίβαν ο, θυμάρι, μαντζουράν α, ρίγανη, βασιλικός, δύσμος, μέντα,						

φύλλα δάφνης, εστραγκόν) (Θ)						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Παρατηρήσεις:**

- \* Στο αμπέλι το διάστημα μεταξύ του τελευταίου ψεκασμού πριν την άνθηση και του πρώτου μετά την άνθηση να είναι 30 ημέρες
- \*\* Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που αυτές εφαρμόζονται.
- \*\*\* Στο αγγούρι ο μέγιστος όγκος νερού στο στρέμμα να εφαρμόζεται με τη μικρότερη δόση 200γρ/100 λιτ. νερό, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση 250 γρ/στρέμμα.
- Σε περίπτωση εφαρμογής με τρακτέρ σε χαμηλές καλλιέργειες η δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 γρ. σκευάσματος στο στρέμμα.
- **Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ANTARCOL 70 WP.**

Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ρόκας και των αρωματικών φυτών από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#) της παρούσας**

Η χρήση στις καλλιέργειες μελιτζάνα υπαίθρου, μελιτζάνα θερμοκηπίου, κολοκυθάκι θερμοκηπίου, θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή

Μελιτζάνα (Υπαίθρου )	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )	120 -	200 -	60- 100 (Υ)	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματο ς .	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημ α 7 ημέρες.
	<b>Αλτερναρίωση</b> ( <i>Alternaria solani</i> )	250 (Υ)	250			
	<b>Κλαδοσπορίωση</b> ( <i>Cladosporium spp.</i> )	120	200	60-		
-Μελιτζάνα (θερμοκηπίου )		- 300 (Θ)	- 250	120 (Θ)		

Κολοκυθάκι (Θερμοκηπίο υ)	<b>Περωνόσπορος</b> ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	200 - 250	200 - 250	100- 120** *	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματο ς.	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα α 7 ημέρες.
---------------------------------	--	-----------------	-----------------	--------------------	--	--

### Β. Το σημείο 13.2 διαμορφώνεται ως εξής:

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	PHI(ημέρες)
Μηλιά	---
Αμπέλι	60 ημέρες
Τομάτα (Υ) Πατάτα (Υ)	14 ημέρες
Τομάτα (Θ)	28 ημέρες
Αγγούρι (Θ)	3 ημέρες
Πεπόνι (Υ) Καρπούζι (Υ)	7 ημέρες
Αρωματικά φυτά (φασκόμηλο, δεντρολίβανο, θυμάρι, μαντζουράνα, ρίγανη, βασιλικός, δυόσμος, μέντα, φύλλα δάφνης, εστραγκόν) (Υ)	14 ημέρες
Αρωματικά φυτά (φασκόμηλο, δεντρολίβανο, θυμάρι, μαντζουράνα, ρίγανη, βασιλικός, δυόσμος, μέντα, φύλλα δάφνης, εστραγκόν) (Θ)	28 ημέρες

Η παρακάτω τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή θα συμπληρωθεί όταν και εάν χορηγηθούν οι χρήσεις στις καλλιέργειες μελιτζάνα (υπαίθρου θερμοκηπίου), κολοκυθάκι θερμοκηπίου

Μελιτζάνα (Υ)	14 ημέρες
Μελιτζάνα (Θ)	28 ημέρες
Κολοκυθάκι (Θ)	3 ημέρες

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό . **127236/16-3 – 2009** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 6174 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **ANTRACOL 70 WP** όπως αυτή ισχύει σήμερα.

**Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Δ. ΓΕΛΑΛΗΣ**