



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 26 - 3 - 2014
Αριθ. πρωτ: 3034/34708

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Κ. Μαρκάκης
Τηλέφωνο: 210 928 7226
e-mail: syg061@minagric.gr

Προς: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τ.Θ. 600 36, 15310-Αγ. Παρασκευή

Κοιν.: Εσωτερική διανομή:
Τμήμα Δ της Δ/νσής μας
(Υπόψη κου Κ. Μαρκάκη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.
1888/7-3-2001 οριστικής
έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (εντομοκτόνο)
DURSBAN 750 WG (δ.ο.
chlorpyrifos 75%) ως προς το
φάσμα δράσης (διεύρυνση σε
ήσσοнос σημασίας χρήση)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας »
4. Την με αριθ. 122986/30-5-2005 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διευρύνθηκε το φάσμα δράσης του σκευάσματος DURSBAN 750 WG
5. Την με αρ. πρωτ. 90467/7-3-2001 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 1888 **οριστική** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DURSBAN

750 WG (δ.ο. chlorpyrifos 75%) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 124787/2-12-2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”»
7. Τη με αριθ. Πρωτ. 3034/34708/13-3-2014/12-2-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
8. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 1888/7-3-2001 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DURSBAN 750 WG (δ.ο. chlorpyrifos 75%), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 90467/7-3-2001 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 124787/2-12-2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα τα σημείο 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος & χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γραμμαρ. σκευάσματος /στρέμμα (max)	γραμ./ 100 λίτρα ψεκάστ υγρού	Όγκος ψεκ. Υγρού: λίτρα / στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπ-φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	-Ψευδόκοκκος (<i>Pseudococcus citri</i>) -Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i>) -Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i>) -Ασπιδωτός (<i>Aspidiotus nerii</i>) -Ισέρυα (<i>Icerya purchasi</i>) -Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphis beckii</i>) -Λοιπές ψώρες -Θρίπες (<i>Thrips spp.</i>) -Αφίδες (<i>Aphis spiraecola</i>) -Ανθοτρήτης (<i>Prays citri</i>)	320	64-80	200-400	Με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ψεκασμών ανά 15 ημέρες. Για τα κοκκοειδή οι ψεκασμοί διενεργούνται από Ιούνιο-Σεπτέμβριο, πριν τα νέα άτομα εγκατασταθούν στον καρπό.	2

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	-Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>) -Ανθονόμος (<i>Anthonomus pomorum</i> , <i>A. piri</i>) -Υπονομευτής (<i>Hyponomeuta malinellus</i> , <i>H. padellus</i>) -Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) -Βαμβακάδα (<i>Diaspis pentagona</i>) -Ματόψειρα (<i>Eriosoma lanigerum</i>) -Φυλλορύκτες (<i>Phyllonorycter blancardella</i> , <i>P. corylifoliella</i> , <i>Cemistoma scitela</i> , <i>Lyonetia clerkella</i>) -Ζεύζερα (<i>Zeuzera pyrina</i>) -Κόσσος (<i>Cossus cossus</i>) -Ξυλοφάγα έντομα	160	64-80	100-200	<p>Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη ανά 15 ημέρες.</p> <p>Για τις ψώρες ψεκάζουμε κατά το φούσκωμα των ματιών, στα μέσα Μαΐου και μετά από 10 ημέρες.</p> <p>Για την καρπόκαψα κάντε τα ραντίσματα που χρειάζονται με δόση 96 γρ./100 λίτρα νερό.</p>	2
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά, Νεκταρινιά Δαμασκηλιά	-Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) -Βαμβακάδα (<i>Diaspis pentagona</i>) -Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i>) -Φυλλοδέτες (<i>Achips rosana</i> , <i>A. rodanus</i> , <i>Adoxophyes orana</i>) -Ζευζέρα (<i>Zeuzera pyrina</i>) -Κόσσος (<i>Cossus cossus</i>) -Ξυλοφάγα έντομα	200	64-80	150-250	<p>Με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ανά 15 ημέρες.</p> <p>Για τις ψώρες ψεκάζουμε κατά το φούσκωμα των ματιών, στα μέσα Μαΐου και μετά από 10 ημέρες.</p> <p>Για καρπόκαψα και ανάρσια κάντε τα ραντίσματα που χρειάζονται με δόση 96 γρ./100 λίτρα νερό.</p>	2

ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Καρότα, Ραπάνια, Κρεμμύδια, Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες, Αγκινάρες	-Αφίδες (<i>Aphis</i> spp. <i>Myzus</i> spp.) -Θρίπες (<i>Thrips</i> spp.) -Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis</i> spp.) -Πιερίδα (<i>Pieris brassicae</i>)	160	160	50-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη μετά από 15 ημέρες.	2
ΒΑΜΒΑΚΙ	-Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) -Ρόδινο σκουλήκι (<i>Pectinophora gossypiella</i>) -Σποντόπτερα (<i>Sprodoptera exigua</i>) -Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i>) -Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i>)	128	-	50-80	Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων. Επόμενος ψεκασμός με την επανεμφάνιση των εντόμων ή μετά από 15 ημέρες.	2
ΠΑΤΑΤΑ	-Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) -Φθοριμαία (<i>Phthorimeae operculella</i>) -Αφίδες (<i>Aphis</i> spp.)	160	-	50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων. Επόμενος ψεκασμός με την επανεμφάνιση των εντόμων ή μετά από 15 ημέρες.	2
Σπαράγγι (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας) ²	Αφίδα σπαραγγιού (<i>Brachycorynella asparagi</i>) Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i>)	128-160	128-160	100	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφόσον χρειαστεί μετά από 15 μέρες	2

Παρατηρήσεις: 1. Για τις καλλιέργειες Αγκινάρα, Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Τομάτες, Μελιτζάνες, Πιπεριές, Πυρηνόκαρπα οι προτεινόμενες εφαρμογές, να μη γίνονται κατά τη διάρκεια της άνθησης.

2. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του σπαραγγιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια του σπαραγγιού ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	30
Μηλοειδή	30
Λοιπές καλλιέργειες	20
Σπαράγγι	20

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 90467/7-3-2001 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 124787/2-12-2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DURSΒAN 750 WG (δ.ο. chlorpyrifos 75%).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

α.α.

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ