



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΑΝΑΝΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΤΡΟΦΙΜΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12 - 9 - 2016

Αριθ.πρωτ: 9147/99828

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 92 12 090
 Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
 Τηλέφωνο: 210 928 7161
 e-mail: chpanagoroulou@minagri.c.gr

Προς: Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
 Σωρού 18-20
 Τ.Κ.151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

E-mail:
ioannis.tsoutsanis@bayer.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60405
 οριστικής έγκρισης του
 φυτοπροστατευτικού προϊόντος
 (μυκητοκτόνο) FLINT MAX 75 WG
 ως προς το φάσμα δράσης (χρήση
 ήσσονος σημασίας)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
3. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»

5. Την αξιολόγηση του Μ.Φ.Ι.
6. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
7. Την υπ' αριθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) απόφαση, με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
8. Την από 26-6--2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **60405** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος(μυκητοκτόνο) **FLINT MAX 75 WG** (δ.ο. **trifloxystrobin+ tebuconazole**), που χορηγήθηκε με την με. αριθ. **1370/18220/7-2 – 2014** απόφαση μας ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Συγκεκριμένα

Α. Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./100 λίτρα νερού	Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/στρέμμα	γρ. σκ./στρέμμα		
Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες)	Ωίδιο (<i>Erysiphe necator</i>)	18-20	100	18-20	Προληπτικοί/Θεραπευτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από την έκπτυξη του πέμπτου φύλλου μέχρι το τέλος της άνθησης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες	3
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Ωίδιο (<i>Erysiphe necator</i>)	18-20	100	18-20	Προληπτικοί/Θεραπευτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από την έκπτυξη του πέμπτου φύλλου μέχρι την έναρξη χρωματισμού των ραγών. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες	3
Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>) Ωίδιο	20	150	30	Προληπτικές εφαρμογές από την περίοδο πριν την άνθηση μέχρι πριν τη συγκομιδή	3

	(<i>Podosphaera leucotricha</i>) Αλτερνάρια (<i>Alternaria alternata</i>)				(πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες	
Αχλαδιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia pirina</i>) Στεμφύλιο (<i>Stemphylium vasicarium</i>)	20	150	30	Προληπτικές εφαρμογές από την περίοδο πριν την άνθηση μέχρι πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες	3
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά,	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	20	150	30	Προληπτικές εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες	2
	Μονίλια (<i>Monilia</i> spp.)				Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης με μεσοδιάστημα εφαρμογών 12-14 ημερών και πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση) με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημερών.	
	Εξώασκος της Ροδακινιάς (<i>Taphrina deformans</i>)				Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες.	
Δαμασκηνιά, Κερασιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	20	150	30	Προληπτικές εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες	3
	Μονίλια (<i>Monilia</i> spp.)				Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης με	

					μεσοδιάστημα εφαρμογών 12-14 ημερών και πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση) με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημερών.	
	Εξώασκος της Ροδακινιάς (<i>Taphrina deformans</i>)				Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες.	
Χρήση ήσσονος σημασίας Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά Δαμασκηνιά, Κερασιά)*	Κλαδοσπόριο (<i>Cladosporium carpopilum</i> συν. <i>Fusicladium carpopilum</i>)	20	150	30	Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο απόσπασης του κάλυκα και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες	2
	Σκωρίαση (<i>Tranzschelia prunispinosae</i>)				Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες	
Ελιά	Κυκλοκόνιο (<i>Spilocaea oleagina</i>)	20	125	25	Προληπτική εφαρμογή από την έναρξη της βλάστησης μέχρι πριν την άνθηση. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες.	1
Τομάτα, Πιπεριά (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	20-30	150 (Θερμοκήπιο) 100 (Υπαίθριες)	30	Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο πριν την άνθηση έως πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα	3

					εφαρμογών: 8-12 ημέρες.	
Χρήση ήσσονος σημασίας Μελιτζάνα * (Υ)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	30	100 (Υ)	20-30	Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο πριν την άνθηση έως πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 8-12 ημέρες.	3
Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Podosphaera fusca</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i>)	20-30	150 (Θερμοκήπιο) 100 (Υπαίθριες)	30	Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο πριν την άνθηση έως πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 8-12 ημέρες.	3
Χρήση ήσσονος σημασίας Αγκινάρα *	Ωίδιο ανθοκεφαλής (<i>Leveillula taurica</i>)	20-25	100	20-25	Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη ανάπτυξης των βλαστών έως πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 8-12 ημέρες.	3

Παρατηρήσεις:

1. Προληπτικές εφαρμογές πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
2. Σε περίπτωση υψηλής προσβολής χρησιμοποιείτε το Flint Max στην υψηλή του δοσολογία και με τα πιο σύντομα μεσοδιαστήματα.

- * Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια των πυρηνόκαρπων, της μελιτζάνας και της αγκινάρας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα II

Β. Το σημείο 13.2 διαμορφώνεται ως εξής:

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες)	Εφαρμογή μέχρι το τέλος της άνθησης
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	14
Μηλιά, Αχλαδιά	14
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, αγκινάρα	7
Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Μελιτζάνα,	3
Ελιά	Δ.Ε. (χρόνος εφαρμογής)

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό . **1370/18220/7-2 – 2014** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **60405** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **FLINT MAX 75 WG** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ