



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 25-05-2015  
Αριθ. πρωτ: 3983/47014**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: [inasiopoulos@minagric.gr](mailto:inasiopoulos@minagric.gr)**

**Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20  
15125-Μαρούσι**

**ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 3055 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (νηματωδοκτόνο) FLOCTER 5 WP (δραστική ουσία *Bacillus firmus* I-1582) σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2587/Β'/14.10.13) με θέμα τη "διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας".
4. Τη σχετική με το θέμα Έκθεση Αξιολόγησης καθώς και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν σχόλια από τα άλλα ΚΜ της νότιας ζώνης.
5. Τη με αριθ. Υ103/2.3.15 (ΦΕΚ 309/Β'/2.3.15) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου".
6. Τις με αριθ. πρωτ. 13669/155854/9.12.14 και 3983/47014/29.4.15 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.
7. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

- Α.** Τροποποιούμε τη με αριθ. **3055** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (νηματωδοκτόνο) **FLOCTER 5 WP** (δραστική ουσία *Bacillus firmus* I-1582), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 8524/93719/26.8.14 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 10303/114837/2.10.14 Απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε χρήσεις ήσσονος σημασίας), ως ακολούθως:

Μετά την παρ. 5 της με αριθ. 8524/93719/26.8.14 Απόφασής μας, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

**5α: Χρήσεις ήσσονος σημασίας:**

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Χλγρ. (κιλά)σκ./σ τρέμμα (max)	Γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος υγρού λιτρα / στρέμμα		
ΜΠΑΜΙΑ	Νηματώδεις ( <i>Heterodera spp</i> , <i>Meloidogyne spp</i> , etc.)	8	---	50-100	<b><u>Μία εφαρμογή</u></b> (Ψεκάσμός εδάφους) Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά, μέχρι και 7 ημέρες πριν, για πιο ελαφριά απορρόφηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει μετά την εφαρμογή να διατηρήσετε το έδαφος υγρό, ποτίζοντας.	1
		4 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 4 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	---	50-100	<b><u>Σταδιακές εφαρμογές (2)</u></b> (Ψεκάσμός εδάφους ) <b><u>1η εφαρμογή:</u></b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά και μέχρι και 7 ημέρες πριν για πιο ελαφριά απορρόφηση.  <b><u>2η εφαρμογή:</u></b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους 5-10 ημέρες μετά τη σπορά και πριν από τη βλάστηση. Και στις δύο περιπτώσεις μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	2
ΡΟΚΑ	Νηματώδεις ( <i>Meloidogyne incognita</i> , <i>Meloidogyne javanica</i> )	8	---	50-100	<b><u>Μία εφαρμογή</u></b> (Ψεκάσμός εδάφους) Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά, μέχρι και 7 ημέρες πριν, για πιο ελαφριά απορρόφηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει μετά την εφαρμογή να διατηρήσετε το έδαφος υγρό, ποτίζοντας.	1

		4 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 4 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	---	50-100	<b>Σταδιακές εφαρμογές (2)</b> (Ψεκάσμος εδάφους) <b>1η εφαρμογή:</b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά και μέχρι και 7 ημέρες πριν για πιο ελαφριά απορρόφηση.  <b>2η εφαρμογή:</b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους 5-10 ημέρες μετά τη σπορά και πριν από τη βλάστηση. Και στις δύο περιπτώσεις μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	2
ΣΕΛΙΝΟ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ)	Νηματώδεις ( <i>Meloidogyne incognita</i> , <i>Meloidogyne javanica</i> )	8	---	300-600	<b>Μία εφαρμογή</b> (Σύστημα στάγδην άρδευσης) Πριν τη μεταφύτευση. Εφαρμόστε 3-10 ημέρες πριν τη μεταφύτευση. Μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	1
		4 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 4 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	---	300-600	<b>Σταδιακές εφαρμογές (2)</b> (Σύστημα στάγδην άρδευσης) <b>1η εφαρμογή:</b> Πριν τη μεταφύτευση. 3-10 ημέρες πριν τη μεταφύτευση. Μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.  <b>2η εφαρμογή:</b> Μετά τη μεταφύτευση. 5-10 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.	2
ΣΕΛΙΝΟ (ΥΠΙΑΙΘΡΟΥ)	Νηματώδεις ( <i>Meloidogyne incognita</i> , <i>Meloidogyne javanica</i> )	8	---	50-100	<b>Μία εφαρμογή</b> (Ψεκάσμος εδάφους) Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά, μέχρι και 7 ημέρες πριν, για πιο ελαφριά απορρόφηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει μετά την εφαρμογή να διατηρήσετε το έδαφος υγρό, ποτίζοντας.	1

		4 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 4 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	---	50-100	<b><u>Σταδιακές εφαρμογές (2)</u></b> (Ψεκασμός εδάφους) <b><u>1η εφαρμογή:</u></b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά και μέχρι και 7 ημέρες πριν για πιο ελαφριά απορρόφηση.  <b><u>2η εφαρμογή:</u></b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους 5-10 ημέρες μετά τη σπορά και πριν από τη βλάστηση. Και στις δύο περιπτώσεις μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	2
ΑΝΤΙΔΙ	Νηματώδεις ( <i>Meloidogyne incognita</i> , <i>Meloidogyne javanica</i> )	8	---	50-100	<b><u>Μία εφαρμογή</u></b> (Ψεκασμός εδάφους) Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά, μέχρι και 7 ημέρες πριν, για πιο ελαφριά απορρόφηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει μετά την εφαρμογή να διατηρήσετε το έδαφος υγρό, ποτίζοντας.	1
		4 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 4 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	---	50-100	<b><u>Σταδιακές εφαρμογές (2)</u></b> (Ψεκασμός εδάφους) <b><u>1η εφαρμογή:</u></b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά και μέχρι και 7 ημέρες πριν για πιο ελαφριά απορρόφηση.  <b><u>2η εφαρμογή:</u></b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους 5-10 ημέρες μετά τη σπορά και πριν από τη βλάστηση. Και στις δύο περιπτώσεις μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	2
ΡΕΒΙΘΙ	Νηματώδεις ( <i>Heterodera spp</i> , <i>Meloidogyne spp</i> , etc.)	8	---	50-100	<b><u>Μία εφαρμογή</u></b> (Ψεκασμός εδάφους) Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά, μέχρι και 7 ημέρες πριν, για πιο ελαφριά απορρόφηση. Σε κάθε	1

					περίπτωση πρέπει μετά την εφαρμογή να διατηρήσετε το έδαφος υγρό, ποτίζοντας.	
		4 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 4 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	---	50-100	<b><u>Σταδιακές εφαρμογές (2)</u></b> (Ψεκασμός εδάφους) <b><u>1η εφαρμογή:</u></b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά και μέχρι και 7 ημέρες πριν για πιο ελαφριά απορρόφηση.  <b><u>2η εφαρμογή:</u></b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους 5-10 ημέρες μετά τη σπορά και πριν από τη βλάστηση. Και στις δύο περιπτώσεις μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	2
ΞΗΡΟ ΦΑΣΟΛΙ	Νηματώδεις ( <i>Heterodera spp.</i> , <i>Meloidogyne spp.</i> , etc.)	8	---	50-100	<b><u>Μία εφαρμογή</u></b> (Ψεκασμός εδάφους) Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά, μέχρι και 7 ημέρες πριν, για πιο ελαφριά απορρόφηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει μετά την εφαρμογή να διατηρήσετε το έδαφος υγρό, ποτίζοντας.	1
		4 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 4 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	---	50-100	<b><u>Σταδιακές εφαρμογές (2)</u></b> (Ψεκασμός εδάφους) <b><u>1η εφαρμογή:</u></b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά και μέχρι και 7 ημέρες πριν για πιο ελαφριά απορρόφηση.  <b><u>2η εφαρμογή:</u></b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους 5-10 ημέρες μετά τη σπορά και πριν από τη βλάστηση. Και στις δύο περιπτώσεις μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	2

ΣΚΟΡΔΟ	Νηματώδεις ( <i>Heterodera spp</i> , <i>Meloidogyne spp, etc.</i> )	8	---	50-100	<b><u>Μία εφαρμογή</u></b> (Ψεκασμός εδάφους) Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά, μέχρι και 7 ημέρες πριν, για πιο ελαφριά απορρόφηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει μετά την εφαρμογή να διατηρήσετε το έδαφος υγρό, ποτίζοντας.	1
		4 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 4 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	---	50-100	<b><u>Σταδιακές εφαρμογές (2)</u></b> (Ψεκασμός εδάφους) <b><u>1η εφαρμογή:</u></b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά και μέχρι και 7 ημέρες πριν για πιο ελαφριά απορρόφηση.  <b><u>2η εφαρμογή:</u></b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους 5-10 ημέρες μετά τη σπορά και πριν από τη βλάστηση. Και στις δύο περιπτώσεις μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	2
ΡΑΠΑΝΑΚΙ	Νηματώδεις ( <i>Heterodera spp</i> , <i>Meloidogyne spp, etc.</i> )	8	---	50-100	<b><u>Μία εφαρμογή</u></b> (Ψεκασμός εδάφους) Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά, μέχρι και 7 ημέρες πριν, για πιο ελαφριά απορρόφηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει μετά την εφαρμογή να διατηρήσετε το έδαφος υγρό, ποτίζοντας.	1
		4 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 4 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	---	50-100	<b><u>Σταδιακές εφαρμογές (2)</u></b> (Ψεκασμός εδάφους) <b><u>1η εφαρμογή:</u></b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά και μέχρι και 7 ημέρες πριν για πιο ελαφριά απορρόφηση.  <b><u>2η εφαρμογή:</u></b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους 5-10 ημέρες μετά τη σπορά και πριν από τη	2

					βλάστηση. Και στις δύο περιπτώσεις μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: (Ρίγανη, Βασιλικός, Δυόσμος, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Θυμάρι, Κάππαρη, Κορίανδρος, Κρόκος, Κύμινο, Λεβάντα, Μάραθος, Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, Μαϊντανός, Άνιθος, Μαστίχα Χίου, Αρώνια, Χαμομήλι, Φασκόμηλο, Ύσσωπος, Σάλβια, Τσάι βουνού, Τριανταφυλλιά (για αρωματοποίηση))	Νηματώδεις ( <i>Heterodera spp</i> , <i>Meloidogyne spp</i> , etc.)	8	---	50-100	<b>Μία εφαρμογή</b> (Ψεκάσμος εδάφους) Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά, μέχρι και 7 ημέρες πριν, για πιο ελαφριά απορρόφηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει μετά την εφαρμογή να διατηρήσετε το έδαφος υγρό, ποτίζοντας.	1
		4 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 4 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	---	50-100	<b>Σταδιακές εφαρμογές (2)</b> (Ψεκάσμος εδάφους) <b>1η εφαρμογή:</b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους για σπορά και μέχρι και 7 ημέρες πριν για πιο ελαφριά απορρόφηση.  <b>2η εφαρμογή:</b> Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους 5-10 ημέρες μετά τη σπορά και πριν από τη βλάστηση. Και στις δύο περιπτώσεις μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	2
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: (Ρίγανη, Βασιλικός, Δυόσμος, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Θυμάρι, Κάππαρη, Κορίανδρος, Κρόκος, Κύμινο, Λεβάντα, Μάραθος, Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, Μαϊντανός, Άνιθος, Αρώνια, Χαμομήλι, Φασκόμηλο,	Νηματώδεις ( <i>Heterodera spp</i> , <i>Meloidogyne spp</i> , etc.)	8	---	300-600	<b>Μία εφαρμογή</b> <b>Σύστημα στάγδην άρδευσης</b> Πριν τη μεταφύτευση. Εφαρμόστε 3-10 ημέρες πριν τη μεταφύτευση. Μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	1
		4 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 4 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	---	300-600	<b>Σταδιακές εφαρμογές (2)</b> <b>Σύστημα στάγδην άρδευσης</b> <b>1η εφαρμογή:</b> Πριν τη μεταφύτευση. 3-10 ημέρες πριν τη μεταφύτευση. Μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	2

Υσσωπος, Σάλβια, Τσάι βουνού, Τριανταφυλλιά (για αρωματοποίηση)					2η εφαρμογή: Μετά τη μεταφύτευση. 5-10 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.	
ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ	Νηματώδεις ( <i>Heterodera spp</i> , <i>Meloidogyne spp</i> , etc.)	8	---	300-600	<b>Μία εφαρμογή</b> <b>Σύστημα στάγδην άρδευσης</b> Πριν τη μεταφύτευση. Εφαρμόστε 3-10 ημέρες πριν τη μεταφύτευση. Μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	1
		4 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 4 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	---	300-600	<b>Σταδιακές εφαρμογές (2)</b> <b>Σύστημα στάγδην άρδευσης</b> 1η εφαρμογή: Πριν τη μεταφύτευση. 3-10 ημέρες πριν τη μεταφύτευση. Μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό. 2η εφαρμογή: Μετά τη μεταφύτευση. 5-10 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.	2
ΠΠΟΦΑΕΣ	Νηματώδεις ( <i>Heterodera spp</i> , <i>Meloidogyne spp</i> , etc.)	8	---	50-100	<b>Μία εφαρμογή</b> (Ψεκασμός εδάφους) Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους 3-10 ημέρες πριν τη μεταφύτευση για πιο ελαφριά απορρόφηση. Μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	1
		4 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 4 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	---	50-100 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 300-600 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	<b>Σταδιακές εφαρμογές (2)</b> <b>1η εφαρμογή:</b> (Ψεκασμός εδάφους) Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους 3-10 ημέρες πριν τη μεταφύτευση. Μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό. <b>2η εφαρμογή:</b> (Σύστημα στάγδην άρδευσης – Ριζοπότισμα) Εφαρμογή στο έδαφος 5-10 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.	2



ΣΤΕΒΙΑ	Νηματώδεις ( <i>Heterodera</i> <i>spp</i> , <i>Meloidogyne</i> <i>spp</i> , etc.)	8	---	50-100	<b><u>Μία εφαρμογή</u></b> (Ψεκασμός εδάφους) Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους 3-10 ημέρες πριν τη μεταφύτευση για πιο ελαφριά απορρόφηση. Μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	1
		4 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 4 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	---	50-100 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 300-600 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	<b><u>Σταδιακές εφαρμογές (2)</u></b> <b><u>1η εφαρμογή:</u></b> (Ψεκασμός εδάφους) Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους 3-10 ημέρες πριν τη μεταφύτευση. Μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.  <b><u>2η εφαρμογή:</u></b> (Σύστημα στάγδην άρδευσης – Ριζοπότισμα) Εφαρμογή στο έδαφος 5-10 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.	2
ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ: Α. ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ	Νηματώδεις ( <i>Heterodera</i> <i>spp</i> , <i>Meloidogyne</i> <i>spp</i> , etc.)	8	---	50-100	<b><u>Μία εφαρμογή</u></b> (Ψεκασμός εδάφους) Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους 3-10 ημέρες πριν τη μεταφύτευση για πιο ελαφριά απορρόφηση. Μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	1
		4 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 4 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	---	50-100 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 300-600 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	<b><u>Σταδιακές εφαρμογές (2)</u></b> <b><u>1η εφαρμογή:</u></b> (Ψεκασμός εδάφους) Ψεκάστε την επιφάνεια του εδάφους 3-10 ημέρες πριν τη μεταφύτευση. Μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.  <b><u>2η εφαρμογή:</u></b> (Σύστημα στάγδην άρδευσης – Ριζοπότισμα) Εφαρμογή στο έδαφος 5-10 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.	2

ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ: Β. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΦΥΤΕΙΑ	Νηματώδεις ( <i>Heterodera</i> <i>spp</i> , <i>Meloidogyne</i> <i>spp</i> , etc.)	8	---	50-100	<b><u>Μία εφαρμογή</u></b> (Σύστημα στάγδην άρδευσης – Ριζοπότισμα) Εφαρμογή στο έδαφος την άνοιξη στο τέλος της περιόδου της βλάστησης πριν την έναρξη της άνθησης για πιο ελαφριά απορρόφηση. Μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.	1
		4 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 4 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	---	50-100 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 300-600 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)	<b><u>Σταδιακές</u></b> <b><u>εφαρμογές (2)</u></b> <b><u>1η εφαρμογή:</u></b> (Σύστημα στάγδην άρδευσης – Ριζοπότισμα) Εφαρμογή στο έδαφος την άνοιξη στο τέλος της περιόδου της βλάστησης πριν την έναρξη της άνθησης. Μετά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να ποτίζεται για να διατηρείται υγρό.  <b><u>2η εφαρμογή:</u></b> (Σύστημα στάγδην άρδευσης – Ριζοπότισμα) Εφαρμογή στο έδαφος 14-21 ημέρες μετά την 1 <sup>η</sup> εφαρμογή.	2

Παρατήρηση: Για τις χρήσεις που αναφέρονται στην παρ. 5α δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Μετά την παρ. 13 της με αριθ. 8524/93719/26.8.14 Απόφασής μας, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

**13α:** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
ΜΠΑΜΙΑ, ΡΟΚΑ, ΣΕΛΙΝΟ (Υ&Θ), ΑΝΤΙΔΙ, ΡΕΒΙΘΙ, ΞΕΡΟ ΦΑΣΟΛΙ, ΣΚΟΡΔΟ, ΡΑΠΑΝΑΚΙ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Υ&Θ) (Ρίγανη, Βασιλικός, Δυόσμος, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Θυμάρι, Κάππαρη, Κορίανδρος, Κρόκος, Κύμινο, Λεβάντα, Μάραθος, Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, Μαϊντανός, Άνιθος, Μαστίχα Χίου (Υ), Αρώνια, Χαμομήλι, Φασκόμηλο, Ύσσωπος, Σάλβια, Τσάι βουνού, Τριανταφυλλιά (για αρωματοποίηση), ΦΥΤΩΡΙΑ, ΙΠΠΟΦΑΕΣ, ΣΤΕΒΙΑ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ.	Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής, όπως ορίζεται στην παρ. 5α).

**Β.** Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 8524/93719/26.8.14, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 10303/114837/2.10.14 Απόφασή μας.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**