



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 28-09-2016

Αριθ. πρωτ: 6773/75207

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: ACTION PIN S.A. Γαλλίας
(δια της εταιρείας INTRACHEM
ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ. ΕΠΕ,
Κηφισίας 31, 11523-ΑΘΗΝΑ)**

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) HELIOSOUFRE 70 SC (δρ. ουσία: sulphur).
2. Ανάκληση της με αριθ. 60.050 άδειας διάθεσης στην αγορά »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80 παρ. 5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *sulphur*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.

8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Κανονισμού 1107/2009”.
9. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ».
10. Την με αριθ. ΑΜΜ Νο 9000222/7.8.15 έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Γαλλίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν HELIOSOUFRE S, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος που αναρτήθηκε από τις Γαλλικές αρχές στον ιστότοπο CIRCA.
11. Τη με αριθ. 60.050 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) HELIOSOUFRE 70 SC (δρ. ουσία: *sulphur*), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 117541/18.4.06 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 92295/19.1.11 και 67/508/3.1.14 αποφάσεις μας.
12. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (Β΄ 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
13. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.
14. Τη με αρ. πρ. 7197/73232/29.6.12 αίτηση της εταιρείας INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ. ΕΠΕ για λογαριασμό της εταιρείας ACTION PIN SA, Γαλλίας, καθώς και τα με αριθ. πρωτ. 11450/130986/20.11.15 και 6773/75207/1.7.16 υποβληθέντα συμπληρωματικά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) HELIOSOUFRE 70 SC (δρ. ουσία: *sulphur*). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.552
28.09.2016
31.12.2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **HELIOSOUFRE 70 SC**
1.2.β Μορφή: **Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)**

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Sulphur
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	99% (β/β) min
Χημική ομάδα	---
Παρασκευαστής	-Zolfindustria Srl Via San Cassiano 99 28069 San Martino di Trecate (Novara) Italy
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: -Zolfindustria Srl Via Cantarana 49/51 27043 San Cipriano Po (Pavia) Italy
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας sulphur προσδιορίζονται στο Part C του dRR της αίτησης με ημερομηνία 29-6-2012 (αρ. πρ. 7197/73232/29.6.12) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ACTION PIN S.A.
Z.I. de Cazalieu – CS 60030
40260 CASTETS – FRANCE

με υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία:
INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Ταχ. Δ/ση: Κηφισίας 31, 11523-ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-6460700, Fax: 210-6440762
E-mail: info@intrachem.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το ν. 4036/2012:

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Ταχ. Δ/ση: Κηφισίας 31, 11523-ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-6460700, Fax: 210-6440762
E-mail: info@intrachem.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ACTION PIN S.A.
ZI de Cazalieu, BP 30, 40260 Castets des Landes, France

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
CIR SIPC
rue J. Coste, BP 613 Courchelettes, 59505 Douai, France

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1) ACTION PIN S.A.
Z.I. de Cazalieu – CS 600300
40260 CASTETS – FRANCE
- 2) ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙ.ΠΕ.Θ. – ΣΙΝΔΟΣ, 57022 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- 3) AGROTECHNICA ΥΙΟΙ ΕΛ. ΚΕΚΡΙΔΗ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. – ΣΙΝΔΟΣ, 57022 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Sulphur 70% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 48,04% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Part C του dRR της αίτησης με ημερομηνία 29-6-2012 (αρ. πρ. 7197/73232/29.6.12) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	250 κ.εκ.	Πολυαιθυλένιο (HDPE)
2	«	500 κ.εκ.	«
3	«	1 λίτρο	«
4	«	1,5 λίτρα	«
5	«	2 λίτρα	«
6	«	5 λίτρα	Πολυαιθυλένιο (HDPE)ή Φθοριωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE)
7	«	10 λίτρα	Πολυαιθυλένιο (HDPE)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Το μείγμα πρέπει να παρασκευάζεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο κατά τα 2/3 με νερό. Ανακινούμε το σκεύασμα καλά και προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο υπό ανάδευση. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά μετά την εφαρμογή σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες συσκευασίας πρέπει να ξεπλένονται τρεις φορές πριν διατεθούν σε χώρους ανακύκλωσης ή ανάκτησης ενέργειας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με ορυκτέλαια, με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης και με γαλακτωματοποιησιμα σκευάσματα.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Συνιστάται η χρήση κατάλληλου και καλά συντηρημένου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του και η τήρηση των κανόνων της ορθής υγιεινής πρακτικής.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής – ακαρεοκτόνο.

5. Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)	κ.εκ./ στρέμμα		
Μηλιά Αχλαδιά	Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	350	100-200	350-700	Στα στάδια πράσινης και ρόδινης κορυφής.	12/7
		90-200		90-400	Στην πτώση των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	
	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	180-400	100-200	180-800	Στα στάδια πράσινης και ρόδινης κορυφής	
		90-200		90-400	Στην πτώση των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	
Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	90-200	150-250	135-500	Στα στάδια πτώσης πετάλων, απόσπασης του κάλυκα και στάδιο καρπιδίου και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	12/7
	Μονίλια (<i>Monilia</i> sp.)	250-400	50-150	125-600	Το χειμώνα, μέχρι τις αρχές της άνοιξης και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	4/7
Κερασιά	Μονίλια (<i>Monilia</i> sp.)	250-400	50-150	125-600	Το χειμώνα, μέχρι τις αρχές της άνοιξης.	4/7
Δαμασκηνιά	Μονίλια (<i>Monilia</i> sp.)	250-400	50-150	125-600	Το χειμώνα, μέχρι τις αρχές της άνοιξης, και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	4/7
	Εξώασκος (<i>Taphrina</i> sp.)	250-400	50-150	125-600	Εφαρμογές το χειμώνα, και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	
Φουντουκιά	Ωίδιο (<i>Phyllactinia guttata</i>)	250-330	50-150	125-500	Εφαρμογές μετά την άνθηση, και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	11/7
Αμπέλι	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	180-400	50-150	90-600	Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκατ.	4
		125-250		65-375	Κατά την άνθηση, μετά το δέσιμο των ραγών και κάθε 15-20 μέρες μέχρι το στάδιο του «γυαλίσματος» των ραγών ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής.	
	Ερίνωση (<i>Eriophyes vitis</i>)	750	50-150	375-1125	Εναρξη έκπτυξης των οφθαλμών.	
Ελιά (ποικιλία πράσινη ελιά Χαλκιδικής)	Ακάρεα της οικογένειας <i>Eriophyidae</i>	320	100-120	384	Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή κατά το στάδιο σχηματισμού των ανθοφόρων οφθαλμών (Απρίλιο) & κατά την πτώση των πετάλων (τέλος ανθοφορίας).	2/30
Φράουλα (Υ+Θ)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca macularis, Podosphaera arhanis</i>)		30-100	100-600	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	6/7

Τομάτα (Υ+Θ)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	200-300	50-100	100-300	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες.	6/7
	Παραμορφωτικό άκαρι (<i>Aculops lycopersici</i>)	150-250	30-100	45-250	Με την εμφάνιση της προσβολής.	
Μελιτζάνα (Υ+Θ)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	200-300	50-200	100-600	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	6/7
Πιπεριά (Υ+Θ)		200-300	50-100	100-300		
Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι και Κολοκύθι α) υπαίθρου β) θερμοκηπίου Πεπόνι (Υ+Θ) Καρπούζι (Υ+Θ)	Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	75-100	50-80	40-80	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	6/7
		75-100	50-200	40-200		
		75-100	50-100	40-100		
Σπανάκι (Υ+Θ) Καρότο (Υ+Θ)	Ωίδιο (<i>Erysiphe spp</i>)		30-100	150-600	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	6/7
Σέλινο (Υ+Θ) Φασόλια χωρίς λοβό (Υ+Θ) Μπιζέλια χωρίς λοβό (Υ+Θ) Μπιζέλια με λοβό (Υ+Θ) Ραδίκι (Υ+Θ)	Ωίδιο (<i>Erysiphe spp</i>)		30-100	150-600	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	6/7
Σιτάρι, Κριθάρι Βρώμη Τριτικάλε	Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis</i>)		50	600	Εφαρμογές από την επιμήκυνση στελέχους έως την πλήρη εμφάνιση του σταχίου. (BBCH 30-59).	2/10
Σόγια Ηλιάνθος	Ωίδιο (<i>Erysiphe spp</i>)		50	500	Εφαρμογές κατά την περίοδο του καλοκαιριού, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	2/10
Λυκίσκος	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca humuli</i>)		80	600	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	6/7
Πατάτα	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i>)		30-100	100-600	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	6/7
Ζαχαρότευτλα	Ωίδιο (<i>Erysiphe betae</i>)		20-50	400-1.000	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	2/10
	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	240-480	40-100	480	Με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη αυτής.	3
Καλλωπιστικά- Ανθοκομικά: Τριανταφυλλιά (Υ+Θ)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	150-300	50-100	75-300	Μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκατ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	6/7

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.
2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
3. Στις καλλιέργειες και στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

4. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχτεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών.
5. Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C.
6. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C.
7. Διακοπή ψεκασμών το λιγότερο 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή των ζαχαρότευτλων.
8. Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Στην καλλιέργεια του αμπελιού να μην εφαρμόζεται πολύ κοντά στη συγκομιδή καθώς αφήνει σημάδια πάνω στους καρπούς. Εφαρμογή σε ώριμα νεκταρίνια μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και για τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολτού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30 °C) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φυτά. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή, καθώς και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς (όπως STARKING, DELICIOUS κ.α.), αχλαδιάς (όπως D'ANJOU κ.α.) και βερικοκιάς κάτω από συνθήκες υψηλής ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών.

9 Σήμανση σκευάσματος:

 GHS05
Προειδοποιητική λέξη: ΚΙΝΔΥΝΟΣ

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας: **H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P102 Μακριά από παιδιά.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
SP1 Μη μολύνετε τα ύδατα με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
SPe 3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα .
SPe 3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από ακαλλιέργητη γη.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Ξεπλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ελιά	90
Ζαχαρότευτλα	μη εφαρμόσιμο
Λοιπές καλλιέργειες του φάσματος δράσης	3

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο καλά αεριζόμενο, ξηρό και δροσερό. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.**16.** Κατάλογος προστατευομένων μελετών: Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.**B.** Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Καν. 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Γ.

Ανακαλούμε τη με αριθ. **60.050** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) HELIOSOUFRE 70 SC (δρ. ουσία: *sulphur*), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 117541/18.4.06 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 92295/19.1.11 και 67/508/3.1.14 αποφάσεις μας, και ορίζουμε τα ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις (3) ακόμη μήνες.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ