



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 27-09-2018

Αριθ. πρωτ: 9521/125663

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 17671-ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: INDOFIL INDUSTRIES
(NETHERLANDS) B.V., Ολλανδίας
(δια της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.,
Ξενίας 1, 11527-Αθήνα)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 60.584 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) INDOFIL PLUS 80 WP (δραστική ουσία: *mancozeb*), ως προς την ημερομηνία λήξης, τα μεγέθη συσκευασίας, τις δηλώσεις προφύλαξης και τις πρώτες βοήθειες»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/84 "για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών *chlorpyrifos*, *chlorpyrifos-methyl*, *clothianidin*, ενώσεις χαλκού, *dimoxystrobin*, *mancozeb*, *mecoprop-p*, *metiram*, *oxamyl*, *pethoxamid*, *propiconazole*, *propineb*, *propyzamide*, *pyraclostrobin* και *zoxamide*".
4. Τη με αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων".
5. Τη με αριθ. πρωτ. 9521/125663/19.9.18 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε., ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας INDOFIL INDUSTRIES (NETHERLANDS) B.V. Ολλανδίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A. Τροποποιούμε την αριθ. 60.584 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) INDOFIL PLUS 80 WP (δραστική ουσία: *mancozeb*), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 9934/108211/14.12.16 (Α.Δ.Α.: 7Σ6Ν4653ΠΓ-1ΑΣ) Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με την αριθ. 2525/35350/30.5.18 (ΑΔΑ: 7ΔΕΛ4653ΠΓ-ΩΕΧ), ως προς την ημερομηνία λήξης, τα μεγέθη συσκευασίας, τις δηλώσεις προφύλαξης και τις πρώτες βοήθειες. Οι παράγραφοι 1.1.β, 2, 5, 11 και 12 της αριθ. 9934/108211/14.12.16 (Α.Δ.Α.: 7Σ6Ν4653ΠΓ-1ΑΣ) Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως εξής:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

31.01.2020

2. Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σάκοι, σακίδια ή κουτιά με εσωτερικά σακίδια	200 γραμ. έως 50 κιλά	(α) Σάκοι πολύφυλλοι, PE/EVOH/PE επένδυση μέσα σε χαρτί/ χαρτί/ PE/ χαρτί. (β) Σάκοι πολύφυλλοι, microperforated PE επένδυση μέσα σε χαρτί/AL/PE/χαρτί/LDPE/χαρτί. (γ) Σάκοι πολύφυλλοι, PE/EVOH/PE επένδυση μέσα σε χαρτί (δ) Σάκοι πολύφυλλοι, PE επένδυση μέσα σε χαρτί/ χαρτί/ χαρτί/ χαρτί. (ε) Σάκοι πολύφυλλοι PE/ PA/ PE επένδυση μέσα σε χαρτί/ χαρτί/ χαρτί/ χαρτί. (στ) Σάκοι πολύφυλλοι, PE επένδυση μέσα σε PE εξωτερικό σάκο. (ζ) Κουτιά χάρτινα με εσωτερικά σακίδια PE.

5. Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο- Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Γραμ / στρ.	Γραμ/ 100 λίτρα ψ.υ.	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Εσπεριδοειδή: νεραντζιά, λεμονιά, μανταρινιά, γκρέιλ-φρουτ	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora sp.</i>)	300	200 - 300	100 - 150	Εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών	1
Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>) Φαιά σήψη (<i>Monilia sp.</i>) (<i>Sclerotinia laxa</i> , <i>S. fructigena</i>)	200	200	100	Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών	Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται
Αχλαδιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia pirina</i>) Σεπτορίωση (<i>Mycosphaerella sentina</i>) Φαιά σήψη (<i>Monilia sp.</i>) (<i>Sclerotinia laxa</i> , <i>S. fructigena</i>)	200	200	100	Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών	Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά	Σκωρίαση (<i>Tranzchelia pruni-spinose</i>) Φαιά σήψη (<i>Monilia sp.</i>) (<i>Sclerotinia laxa</i>)	200	200	100	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών, ειδικά σε βροχερή και υγρή άνοιξη	Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται
Κερασιά	Σκωρίαση (<i>Puccinia cerasi</i>), Φαιά σήψη (<i>Monilia sp.</i>) (<i>Sclerotinia laxa</i>) Προσβολή φύλλων (<i>Gnomonia erythrostoma</i>) Κορόνιο (<i>Stigmia carpophila</i>)	200	200	100	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών, ειδικά σε βροχερή και υγρή άνοιξη	Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>) Μαύρη σήψη (<i>Guignardia bidwellii</i>)	200	200	100	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών	Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 16 ημέρες εφόσον απαιτείται

Ελιά	Κυκλοκόνιο (<i>Spilocaea oleagina</i>)	300	200 - 300	100 - 150	Εφαρμογή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών	1
Σκόρδο, Κρεμμύδι Ασκαλώνια	Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i>)	250	200-250	100 - 125	Εφαρμόζεται από το στάδιο του φυταρίου εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών	Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 10 ημερών εφόσον απαιτείται
Καρότο, Λαγόχορτα- λαχανίδες	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria dauci</i>) Περονόσπορος (<i>Plasmopara nivea</i>)	200	200	100	Εφαρμόζεται από το στάδιο του φυταρίου εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών	Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 14 ημερών εφόσον απαιτείται
Τομάτα (Υ) Μελιτζάνα (Υ)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>) Ανθρακωση (<i>Colletotrichum phomoides</i>)	200	200	100	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο του 3 ^{ου} πραγματικού φύλλου	Μέχρι 5 εφαρμογές ανά 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Πιπεριά (Υ)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>) Ανθρακωση (<i>Colletotrichum capsici</i>)	200	200	100	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο του 3 ^{ου} πραγματικού φύλλου	Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Κολοκυθάκι (Υ) Αγγουράκι (Υ) Αγγούρι (Υ) Πεπόνι (Υ) Κολοκύθα (Υ)	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Ανθράκωση (<i>Colletotrichum lagenarium</i>)	200	200	100	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο του 5 ^{ου} φύλλου	Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μπρόκολο	Περονόσπορος (<i>Peronospora brassicae</i>) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria sp.</i>)	200	200	100	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο των φυταρίων	Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μαρούλι (Υ)	Περονόσπορος (<i>Bremia lactuca</i> , <i>Peronospora brassicae</i>)	200	200	100	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών, μετά την μεταφύτευση	Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Πράσο	Περονόσπορος (<i>Peronospora sp.</i> , <i>Phytophthora porri</i>)	250	200 - 250	100-125	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο των φυταρίων	Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σπαράγγι	Σκωρίαση (<i>Puccinia asparagi</i>)	200	200	100	Ψεκασμοί μετά την συγκομιδή	Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μπιζέλια (αρακάς) (όσπρια)	Ανθράκωση (<i>Colletotrichum pisi</i>) Περονόσπορος (<i>Peronospora pisi</i>)	200	200	100	Εφαρμογή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο του 3 ^{ου} φύλλου έως το 50%	1

					του τελικού μεγέθους των καρπών	
Φασόλια, (όσπρια)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria spp.</i>) Ανθράκωση (<i>Colletotrichum spp.</i>) Σκωρίαση (<i>Uromyces spp.</i>)	200	200	100	Εφαρμογή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών	1
Πατάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) Αλτερνάρια (<i>Alternaria solani</i>)	200	200	100	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το φύτρωμά της καλλιέργειας.	Μέχρι 8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σιτάρι	Σεπτορίωση (<i>Septoria tritici</i>) Σκωρίαση (<i>Puccinia sp.</i>)	200	200	100	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών έως την πλήρη άνθηση	Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καλλωπιστικά φυτά και θάμνοι Υπαίθρου	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria sp.</i>), <i>Aschochyta sp.</i> , <i>Phyllosticta sp.</i>) Περονόσπορος (<i>Bremia sp.</i> , <i>Peronospora sp.</i> , <i>Pseudoperonospora sp.</i> , <i>Plasmopara sp.</i>), Σκωρίαση (<i>Cronarthium sp.</i> , <i>Gymnosporangium sp.</i> , <i>Phragmidium sp.</i> , <i>Puccinia sp.</i> , <i>Uromyces sp.</i>)	200	200	100	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών	Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 7 (φυτά)- 10 (θάμνοι) ημέρες εφόσον απαιτείται

Παρατηρήσεις:

1. Το **INDOFIL PLUS 80 WP** είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο. Η πρώτη εφαρμογή είναι καλό να γίνεται πριν την προβλεπόμενη εμφάνιση της ασθένειας. Οι εφαρμογές επαναλαμβάνονται ανάλογα με την πίεση της προσβολής και σύμφωνα με τα συνιστώμενα μεσοδιαστήματα ψεκασμών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαιτείται προστασία.
2. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής.
3. Η δόση/ 100 λίτρα νερού να συνδυαστεί καταλληλά με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη δόση /στρ.
4. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος το φύλλωμα πρέπει να είναι στεγνό μετά από άρδευση ή βροχή.
5. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα εάν αναμένεται βροχή εντός 4 ωρών.
6. Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του **INDOFIL PLUS 80 WP**.
7. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται.

11. Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P201+P202: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα.
 «Φοράτε προστατευτικά γάντια και κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή».
 Φοράτε κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή με τρακτέρ χωρίς κλειστή καμπίνα.
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Sp1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα.
40 μέτρων σε δένδρα,

12 μέτρων σε Αμπέλι,
5 μέτρων στις υπόλοιπες καλλιέργειες.
ΕΥΗ401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

12. Πρώτες
 βοήθειες –
 Αντίδοτο

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το διάλυμα ρούχα.
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό.
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 77.93.777

B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η αριθ. 9934/108211/14.12.16 (Α.Δ.Α.: 7Σ6Ν4653ΠΓ-1ΑΣ) Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2525/35350/30.5.18 (ΑΔΑ: 7ΔΕΛ4653ΠΓ-ΩΕΧ) Απόφασή μας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ