



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30-10-2018  
Αριθ. πρωτ: 5828/78831

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ  
Τηλέφωνο: 210 928 7237  
e-mail: [apapamichail@minagric.gr](mailto:apapamichail@minagric.gr)

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20  
Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι  
e-mail: [nikos.tsakalis@bayer.com](mailto:nikos.tsakalis@bayer.com)

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της με αριθ. 60.697 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LUNA SENSATION SC (fluopyram+trifloxystrobin) ως προς το φάσμα δράσης, τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. fluopyram, τις πληροφορίες για το σκεύασμα, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 37.4 και 33 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 802/2013, της Επιτροπής της 22ας Αυγούστου 2013 για την έγκριση της δραστικής ουσίας **fluopyram**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2017/841, της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης ορισμένων δραστικών ουσιών μεταξύ των οποίων και η δ.ο. **trifloxystrobin**.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
9. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 10954/106136/10-10-2017 και 5828/78831/05-06-2018 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
10. Την σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αγγλίας (Interzonal RMS - Οκτώβριος 2018).
11. Την υπ' αρ. ΕΜΠ 1915/24-10-2018 εισήγηση του Μ.Φ.Ι. όσον αφορά στον οικοτοξικολογικό έλεγχο και στον έλεγχο της τύχης και συμπεριφοράς στο περιβάλλον.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A**

Τροποποιούμε την με αριθ. **60.697** οριστική έγκριση διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **LUNA SENSATION SC** (δραστικές ουσίες **fluopyram + trifloxystrobin**) που χορηγήθηκε με την με αριθ. **6697/90917/31-07-2018** απόφαση μας ως προς τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. fluopyram, τις πληροφορίες για το σκεύασμα, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

**Συγκεκριμένα τα σημεία 1.3.1, 1.4στ, 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:**

#### 1.3 Δραστικές ουσίες

##### Δραστική ουσία 1 (fluopyram)

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Bayer AG</b> Alte Heerstrasse D-41538 Dormagen, Γερμανία</li> <li><b>2. Bayer CropScience LP</b> 8400 Hawthorn Rd, Kansas City, MO 64120, ΗΠΑ</li> <li><b>3. Allessa GmbH,</b> <b>Alt-Fechenheim</b> <b>34, 60386 Frankfurt, Γερμανία</b></li> <li><b>4. Fine Organics Ltd.,</b> <b>Seal Sands, Middlesborough</b> <b>TS2 1 UB, Ηνωμένο Βασίλειο</b></li> </ol>
--------------------------------	--

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Δραστικές ουσίες: fluopyram 25% β/ο, trifloxystrobin 25% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 55,48% β/β  Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο <b>Part C</b> της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του <b>UK</b> του <b>Οκτώβρη 2018</b> . Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ
--	--

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλ/κη περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	κ.εκ. / στρ. (max)	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα / στρ.		
Μαρούλι (Θ) (LACSA)	<b>Βοτρύτης</b> <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) <b>Σκληρωτινίαση</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (SCLESC) <i>S. minor</i> (SCLEMI) <b>Ριζοκτόνια</b> <i>(Rhizoctonia solani)</i> (RHIZSO) <b>Κερκοσπορίωση</b> <i>(Cercospora beticola)</i> (CERCBE)	---	80	30-80	Εφαρμογή από την εμφάνιση του 3ου φύλλου μέχρι το μαρούλι να φτάσει το 50% του τυπικού μεγέθους του (BBCH 13-45).	1
Καπνός (ΝΙΟΤΑ)	<b>Βοτρύτης</b> <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) <b>Σκληρωτινίαση</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (SCLESC) <i>S. minor</i> (SCLEMI)	---	80	50-100	Εφαρμογές από το στάδιο που το φυτό έχει φτάσει το 50% του τελικού ύψους του μέχρι το 20% της άνθησης (BBCH 35-62).	1
Φράουλα (Θ + Υ) (FRAAN)	<b>Ωΐδιο</b> <i>Sphaerotheca macularis</i> / <i>Podosphaera macularis</i> (SPHRMA) <b>Ανθράκωση</b> <i>Colletotrichum fragariae</i> (COLLFR) <b>Βοτρύτης</b>	---	80	30-80	Εφαρμογή από την έναρξη ανάπτυξης των νεαρών φυτών (σχηματισμός των στολώνων) μέχρι την πλήρη ωρίμανση	(Θ): 2 / 7  (Υ): 1

	<i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) <b>Σεπτορίωση</b> <i>Mycosphaerella fragariae</i> (MYCOFR)				(BBCH 40-89).	
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες και Επιτραπέζιες ποικιλίες) (VITVI)	<b>Ωίδιο</b> <i>Uncinula necator</i> / <i>Erysiphe necator</i> (UNCINE)	(10-67)	20	50-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση του 5ου φύλλου έως το μέγεθος σκαγιού (BBCH 15-73).	2 / 21
	<b>Μαύρη σήψη</b> <i>Guignardia bidwellii</i> (GUIGBI)	(13-67)	20			2 / 14
Φασόλια με λοβό (Υ) (PHSVX)	<b>Βοτρύτης</b> <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) <b>Σκληρωτινίαση</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (SCLESC)	---	80	30-80	Εφαρμογές από την πλήρη ανάπτυξη/ εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι οι λοβοί να αποκτήσουν το 50% του τελικού μεγέθους τους (BBCH 61-75).	1
Τομάτα (Θ) (LYPES) Πιπεριά (Θ) (CPSAN) Μελιτζάνα (Θ) (SOLME)	<b>Βοτρύτης</b> <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)	40	30	75	Εφαρμογές από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 51-89). <b>Μέγιστο ύψος καλλιέργειας</b> <b>100 εκ.</b>	2/10-14

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση Ανθεκτικότητας:**

Για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται μυκητοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια, στα πλαίσια αμειψισποράς. Αποφύγετε την εφαρμογή κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας, πιπεριάς και μελιτζάνας επιτρέπεται η χρήση του Luna Sensation **μόνο** μέχρι το ύψος φυτών 1 μέτρου.

11

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

**P102:** Μακριά από παιδιά.

**P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο.

**P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα και γάντια.

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

**Spe1:** Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει trifloxystrobin περισσότερο από 1 φορά ανά έτος στη μέγιστη δόση 200 γρ δ.ο./στρέμμα.

**Spe3:** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τις γειτονικές καλλιέργειες.

**Spe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε:

- Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** για τις καλλιέργειες του αμπελιού, του φασολιού και του καπνού, **της τομάτα (Θ), της πιπεριάς (Θ) και της μελιτζάνας (Θ).**
- Μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** ή χρησιμοποιείστε **ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 50%** για τις καλλιέργειες της φράουλας και του μαρουλιού.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες και Επιτραπέζιες ποικιλίες), Φασόλια με λοβό (Υ)	14
Μαρούλι (Θ)	7
Φράουλα (Θ + Υ), Πιπεριά (Θ), Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ)	3
Καπνός	Μη εφαρμόσιμο

**B** Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 6697/90917/31-07-2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ