



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα  
TELEFAX: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287 249**

**Αθήνα, 11-12-2012**

**Αριθ. πρωτ.: 11246/112275**

**ΠΡΟΣ: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20  
151 25 Μαρούσι.**

**ΚΟΙΝ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο.**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά, στο  
βιοκτόνο προϊόν (εντομοκτόνο)  
Maxforce Prime.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το άρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ.2.
3. Τη με αριθ. 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα»
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Έντολή Υφυπουργού».
5. Τη με αριθ. 116073/14-2-2006 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 12466 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο Maxforce White IC όμοιο με το υπό έγκριση.
6. Την από 30-10-12 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, και το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0034** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα : Maxforce Prime**
  - 2. Μορφή :** Ετοιμόχρηστο δόλωμα υπό μορφή gel (Gel Bait)
  - 3. Εγγυημένη σύνθεση :** imidacloprid 2,15% β/β.  
Βοηθητικές ουσίες : 97,79 % β/β.
  - 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία : 97 % min.
  - 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Bayer SAS, Environmental Science, 16 rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, France.  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** Bayer CropScience AG, Γερμανία  
**γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** Όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
  - 6. α. Κάτοχος της Έγκρισης.:** Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-20, Μαρούσι.  
**β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** Bayer Ελλάς ABEE
  - 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, France.
  - 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Bayer SAS, Bayer CropScience France - site de Marles.
  - 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Bayer SAS, Bayer CropScience France - site de Marles.
  - 10. Συσκευασία : - Είδος – Μέγεθος:** 1) Πλαστικά φυσιγγια (dispenser) με περιεχόμενο 10, 20 και 30 γρ. σκευάσματος με τυπωμένα τα στοιχεία του σκευάσματος και τις προφυλάξεις και συσκευασμένα σε κουτί με τυπωμένη την πλήρη ετικέτα και 2) πλαστική σύριγγα με περιεχόμενο 5, 10, 20 και 30 γρ. σκευάσματος με τυπωμένα τα στοιχεία του σκευάσματος και τις προφυλάξεις και συσκευασμένη σε κουτί με τυπωμένη την πλήρη ετικέτα. Η εφαρμογή των φυσιγγίων (1) γίνεται με ειδικό πιστόλι.  
- **Υλικό:** α) Πλαστικό φυσιγγίο (dispenser) και πλαστική σύριγγα από Πολυπροπυλένιο.  
β) Χάρτινο κουτί που περιέχει τα φυσιγγια και τις σύριγγες.
- Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:  
**«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**
- 11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται**  
Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση της Γερμανικής και Ανατολικής κατσαρίδας (*Blattella germanica* και *Blatta orientalis*) και της Αμερικανικής κατσαρίδας (*Periplaneta americana*).
  - 12. Τρόπος εφαρμογής**  
Τοποθέτηση σταγόνων σε επιλεγμένα σημεία. Μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους.
  - 13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού : ---**

**14. Φάσμα δράσης :**

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις	Τρόπος Εφαρμογής
Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι όπως εργοστάσια, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, γραφεία, ορόφους τροφίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία, αεροπλάνα, τρένα, περιοχές ηλεκτρικών συσκευών και υπολογιστές.	<b>1.</b> Γερμανική κατσαρίδα ( <i>Blattella germanica</i> ) και Ανατολική κατσαρίδα ( <i>Blatta orientalis</i> ) οι οποίες είναι μικρού τελικού μεγέθους	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 σταγόνα ζελέ ανά θέση δόλωσης. 1-2 θέσεις δόλωσης ανά τ.μ. επιφάνειας ή ανά μέτρο ευθείας γραμμής. Σε περίπτωση έντονης μολύνσεως να αυξηθούν οι θέσεις δολώσεως ανάλογα.</li> </ul>	Τοποθέτηση σταγόνων σε επιλεγμένα σημεία.
	<b>2.</b> Αμερικάνικη κατσαρίδα ( <i>Periplaneta americana</i> ) η οποία είναι μεγάλου τελικού μεγέθους.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 σταγόνες ζελέ ανά θέση δόλωσης για την αμερικάνικη κατσαρίδα. 1-2 θέσεις δόλωσης ανά τ.μ. επιφάνειας ή ανά μέτρο ευθείας γραμμής. Σε περίπτωση έντονης μολύνσεως να αυξηθούν οι θέσεις δόλωσης ανάλογα.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 σταγόνα διαμέτρου 7mm αντιστοιχεί σε 0,1 γρ.</li> </ul>	

**Οδηγίες χρήσεως:**

- Οι θέσεις δολώσεως και ο πληθυσμός καθορίζονται με τη χρήση παγίδων με κόλλα.
- Οι θέσεις δολώσεως ελέγχονται περιοδικά και ανανεώνονται η ποσότητα δολώματος, αν αυτό έχει καταναλωθεί, λόγω διαδοχικών επισκέψεων των κατσαρίδων.
- Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμοσθεί σε σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα ή με ζωοτροφές.
- Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμοσθεί σε σημεία, όπου ο καθαρισμός ρουτίνας μπορεί να το μετακινήσει σε επιφάνειες που μπορεί να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή τροφή.
- Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμοσθεί σε σημεία που σφουγγαρίζονται τακτικά επειδή το ζελέ μπορεί να αφαιρείται με το πλύσιμο.
- Να μην εφαρμοσθεί το ζελέ σε σημεία που ψεκάστηκαν πρόσφατα με εντομοκτόνα και να μην ψεκάσθει εντομοκτόνο επάνω στο ζελέ διότι μειώνεται η δράση του.
- Η επαφή με ύφασμα μπορεί να επιφέρει αλλοίωση του χρώματος του τελευταίου.

**15. Φυτοτοξικότητα :** ---**16. Συνδυαστικότητα :** ---**17. Σημάνσεις :** N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

**18. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο ( R φράσεις ) :**

**R43** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

**19. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα :**

**R51/53** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**20. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία ( S φράσεις)**

**S 1/2:** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

**S 13:** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

**S 20/21:** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

**S60:** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

**S61:** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα ---****Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**22. Πρώτες Βοήθειες :**

**Γενικά:** Μεταφέρετε τον πάσχοντα μακριά από την επικίνδυνη περιοχή και τοποθετείστε τον σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική βοήθεια.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους μετά το πρώτο 5 λεπτό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική βοήθεια.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια ή το κοντινότερο ιατρικό κέντρο.

**Πληροφορίες για το γιατρό****Θεραπευτικά μέτρα :**

Συμπτωματική θεραπεία. Ελέγχετε την αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία.

Εφαρμόστε πλύση στομάχου και χορηγήστε ενεργό άνθρακα και sodium sulfate.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**23. Απαγορεύσεις ( A φράσεις ) :**

**Μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**24. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:**

**25. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου, σε μέρος ξηρό και στην αρχική του κλειστή συσκευασία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.

**25. Καταστάματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση του μόνο από καταστάματα γεωργικών φαρμάκων.

**II. Ετικέτα:**

- α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.
- β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.,

**III.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία imidacloprid που περιέχεται στο **Maxforce Prime**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ**