



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.10.2015  
Αριθ. πρωτ: 3783/44371

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ

Προς: SYNGENTA Hellas ABEE  
Λ. Ανθούσας  
15349 – Ανθούσα Αττικής

TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκίλη  
Τηλέφωνο: 210 92 87 254  
e-mail: [dpitarokili@minagric.gr](mailto:dpitarokili@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ:** “Τροποποίηση της με αριθ. 60400 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORTIVA TOP 20/12,5 SC (azoxystrobin 20% + difenococonazole 12,5% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις”

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθμ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
4. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ6252/78481(ΦΕΚ 1503/Β/17.07.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Την από 25.07.2013 αξιολόγηση (Registration Report) της Αρμόδια Αρχής Αξιολόγησης.
6. Την από 22.04.2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. **60400** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORTIVA TOP 20/12,5 SC (azoxystrobin 20% + difenococonazole 12,5% β/ο) που χορηγήθηκε με την αριθ. 758/10362/24.01.2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 11, 12 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης		Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθμός εφαρμογών / καλ/κή περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	κ.εκ/ στρ. (max)	κ.εκ σκ./ 100 λ ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού λ/ στρ.		
Ρύζι	<i>Pyricularia oryzae</i> <i>Helminthosporim sp.</i>	80-100	--	20-40	Ψεκασμός BBCH 47-61	2 εφαρμογές ανά 15 ημέρες Η πρώτη εφαρμογή στο BBCH 47-51, και η δεύτερη εφαρμογή εάν κρίνεται απαραίτητη στο BBCH 57-61
Κουνουπίδι Λάχανο	<i>Alternaria brassicae</i>	100	--	20-60	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-55	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Μπρόκολο (ήσσονος σημασίας χρήση)	<i>Alternaria brassicae</i>	100	--	20-60	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-55	2 εφαρμογές ανά 12 ημέρες
Σέλινο (ήσσονος σημασίας χρήση)	<i>Septoria apii</i>	100	--	20-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-48	3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες

Αγγούρι, Κολοκύθι (Α)	<i>Erysiphae cichoracearum Sphaerotheca fuliginea</i>	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 51-89	3 εφαρμογές ανά 10 ημέρες
Τομάτα (Α)	<i>Alternaria spp. Leveillula taurica</i>	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 20-87	3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες
Τομάτα (Θ)	<i>Leveillula taurica</i>	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 16- 87	3 ανά 8 ημέρες
Μελιτζάνα (Α)	<i>Oidium neolycopersici</i> (ήσσοнос σημασίας ασθένεια)	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 20-87	3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες
Μελιτζάνα (Θ)	<i>Leveillula taurica Oidium neolycopersici</i> (ήσσοнос σημασίας ασθένεια)	100	100	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 16-87	3 εφαρμογές ανά 8 ημέρες
Πιπεριά (Θ)	<i>Leveillula taurica</i>	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 20-87	2 εφαρμογές ανά 10 ημέρες

Πράσο (ήσσοнос σημασίας χρήση)	<i>Alternaria porri</i> <i>Puccinia allii</i>	100	--	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-49	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Σπαράγγι (ήσσοнос σημασίας χρήση)	<i>Puccinia asparagi</i>	100	--	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 41-89	2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες
Μπιζέλι (αρακάς) (ήσσοнос σημασίας χρήση)	<i>Ascochyta pisi</i>	100	--	30-100	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 59-77	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Μαϊντανός (ήσσοнос σημασίας χρήση)	<i>Septoria apii</i>	100	--	20-60	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 41-46	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Πεπόνι Καρπούζι (Α/Θ)	<i>Erysiphae cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i> <i>Cladosporium cucumerinum</i>	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 21-89	3 εφαρμογές ανά 8 ημέρες
Αγκινάρα (ήσσοнос σημασίας χρήση)	<i>Erysiphae cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	100	--	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-55	3 εφαρμογές ανά 10 ημέρες

Κρεμμυδάκι χλωρό (ήσσοнос σημασίας χρήση)	<i>Alternaria porri</i> <i>Puccinia allii</i>	100	--	30-60	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-49	2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες
Σκόρδο (ήσσοнос σημασίας χρήση)	<i>Alternaria porri</i> <i>Puccinia allii</i>	100	--	30-60	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-45	2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες
Καρότο	<i>Alternaria dauci</i>	100	--	20-60	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-49	3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Φράουλα (Θ)	<i>Podosphaera</i> <i>spp.</i>	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 60-89	3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες
Σμέουρα (ήσσοнос σημασίας χρήση)	<i>Podosphaera</i> <i>spp.</i> <i>Mycosphaerella</i> <i>nawai</i>	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 60-89	3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες

**Παρατηρήσεις**

1. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες: μπρόκολο, σέλινο, πράσο, σπαράγγι, μπιζέλι, μαϊντανός, αγκινάρα, κρεμμυδάκι χλωρό, σκόρδο και σμέουρα από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P272:** Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία.

**P363:** Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

*Μην εισέρχετε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκασμό. Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα μετά τον ψεκασμό, θα πρέπει να φοράνε γάντια.*

**Sp1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη 5 μέτρων από επιφανειακά ύδατα ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια χαμηλής διασποράς, που επιτυγχάνουν μείωση κατά 50%, για την καλλιέργεια της φράουλας.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη 15 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια σμέουρων (όψιμη εφαρμογή).

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους 10-12 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες της τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς, αγγουριού, κολοκυθιού, πεπονιού, καρπουζιού, σκόρδου και σμέουρων (πρώιμη εφαρμογή).

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους 10-12 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς, που επιτυγχάνουν μείωση κατά 50%, για τις καλλιέργειες σπαραγγιού, αγκινάρας, καρότου, μπρόκολου, κουνουπιδιού, λάχανου, πράσου, χλωρού κρεμμυδιού, σέλινου, μαϊντανού.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες βοήθειες –  
Αντίδοτο

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ**

Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**Κατάποση:** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό.

**Επαφή με τα μάτια:** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.

**P312:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**P333+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**P304+P340:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο Μην προκαλείτε εμετό.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 210-7793777

**13**

**13.1** Μέγιστα Όρια  
Υπολειμμάτων  
(MRLs)

Προσωρινά σε mg/kg στην ΕΕ
Έχουν καθοριστεί οριστικά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα II του Κανονισμού 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.

<b>13.2</b> Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	Ημέρες
Τομάτα (Α), Μελιτζάνα (Α), Αγκινάρα, Μπιζέλι, Φρέσκο κρεμμυδάκι, Σμέουρα	7
Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Α), Κολοκύθι (Α), Πεπόνι (Α/Θ), Καρπούζι (Α/Θ), Φράουλα (Θ)	3
Σπαράγγι	Δ/Ο
Καρότο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Μαϊντανός (Α), Σκόρδο, Σέλινο	14
Λάχανο, Πράσσο	21
Ρύζι	28

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 758/10362/24.01.2014 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή ισχύει.

**Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης**

**Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**