



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 9 - 5 - 2011  
Αριθ. πρωτ: 96527

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
 TELEFAX: 210 92 12 090  
 Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα  
 Τηλέφωνο: 210 928 7228  
 e-mail: [syg064@minagric.gr](mailto:syg064@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 7808/9-1-2007 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC (πρώην QUIZALOFOP-P-ETHYL INAGRO) ως προς το εμπορικό όνομα, τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., τον κάτοχο της έγκρισης, τον παρασκευαστή του σκευασμάτος, το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευασμάτος, τη συσκευασία, τη σήμανση και την ημερομηνία λήξης του.»

Προς: **SHARDA BALKAN Μ.Ε.ΠΕ**  
**Παύλου Μελά 1, 152 33 –**  
**Χαλάνδρι, δια της**  
**Τουτουτζιδάκης Α. & ΣΙΑ ΕΕ**  
**Τσιτούρη 22, 152 31, Χαλάνδρι**  
**(με απόδειξη)**

Κοιν.: 1. **Γραφείο Υπουργού κ. Κ.  
 Σκανδαλίδη**  
 2. **Γραφείο Υφυπουργού  
 κ κ. Ι. Κουτσούκου**  
 3. **Περιφεριακές Ενότητες  
 Δ/νσεις Αγροτικής  
 Οικονομίας & Κτηνιατρικής  
Έδρες τους**  
 4. **Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
 Ινστιτούτο  
 Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
 Φαρμάκων  
 Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά**  
 5. **Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους**  
 6. **ΕΣΥΦ  
 Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα**  
 7. **Εσωτερική διανομή:  
 -Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
 Δ/νσής μας  
 -Γραμματεία της Δ/νσής μας**  
 8. **Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
 Διδότου 26, Αθήνα**  
 9. **INAGRO Ε.Π.Ε.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
 Ο  
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

- Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/A/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/EOK του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
  - Τη με αριθ. 132792/30-9-2009 (ΦΕΚ 2185/B/2-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την “καταχώριση των δραστικών ουσιών chlormequat, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron, zeta-cypermethrin και των ενώσεων χαλκού” στο Παράρτημα I του π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία

- 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/37/EK της Επιτροπής της 23.4.2009".
3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφέρες φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
  4. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154 Α').
  5. Τη με αριθ. 271752/21-10-2010 (ΦΕΚ 1673/B'/21-10-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη-Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».
  6. Τις με αριθ. πρωτ. 134779/30-11-2009, 93111/11-2-2011 και 94695/21-3-2011 αιτήσεις της εταιρείας SHARDA BALKAN M.ΕΠΕ. δια της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. **7808** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ((ζιζανιοκτόνο) **QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC** (πρώην QUIZALOFOP-P-ETHYL INAGRO) που χορηγήθηκε με την αριθ. 115061/9-1-2007 Υπ. Απόφαση, ως προς το εμπορικό όνομα, τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., τον κάτοχο της έγκρισης, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τη συσκευασία, τη σήμανση και την ημερομηνία λήξης του και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

- 1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**  
 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
 1.1.β Ημερομηνία λήξης

**7808**  
**9-1-2007**  
**31 – 05 - 2014**

### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1.2.α Εμπορικό όνομα | <b>QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC</b> |
| 1.2.β Μορφή:         | Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)                |

### **1.3 Δραστική ουσία (εξ)**

- α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO      Quizalofop-p-ethyl  
 (χημική ομάδα: Αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκά Οξέα )

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:      Quizalofop-p-ethyl: 950 g/kg min

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

**Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, Ινδία**

Με Εκπρόσωπο στην Ευρώπη

Sharda Europe b.v.b.a,  
 Heedstraat 58, T.K. 1730 Asse – Βέλγιο  
 Τηλ.: +32 2 4664 444  
 Fax: +32 2 4633658  
 E-mail: [regn@shardaintl.com](mailto:regn@shardaintl.com)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**Shandong Goodfarmer Chemical Co. Ltd,**  
Κίνα

(η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Quizalofop-p-ethyl όπως έχουν κατατεθεί από την Παρασκευάστρια Εταιρεία Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, Ινδία, κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρηση με ημερομηνία 1-12-2009 (Αρ.Πρ. Y.A.A.T. 134850) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

**SHARDA BALKAN Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,**  
Παύλου Μελά 1, 152 33 Χαλάνδρι

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος  
Τσιτούρη 22, 152 31 Χαλάνδρι  
Τηλ. 210 6725174  
Email: [aconsult@otenet.gr](mailto:aconsult@otenet.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

**Sharda Europe b.v.b.a,**  
Heedstraat 58,  
T.K. 1730 Asse - Βέλγιο

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Sharda Europe b.v.b.a,**  
Heedstraat 58,  
T.K. 1730 Asse - Βέλγιο

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**Shandong Goodfarmer Chemical Co. Ltd,**  
Κίνα

(η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας).

- ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ, Σίνδος, Θεσσαλονίκη
2. IRCA SERVICE SPA, Ιταλία
3. Chemia SPA, Via Statale, Ιταλία
4. Alcotan, Ισπανία
5. ZAKLADY CHEMICZNE ORGANIKA SARZYNA SA, Πολωνία

- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Quizalofop-p-ethyl: 5% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 94,60% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην Πρόταση DPD του σκευάσματος με ημερομηνία 21-3-2011 (Αρ. Πρ. Y.A.A.T. 94695) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

## 2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	250, 500, 750 κ.εκ. & 1 και 2 λίτρα	Πλαστικό τύπου COEX, HDPE, SELLAR, PET ή αλουμίνιο
2	Δοχεία	2, 3, (3.5), 5, 10 και 20 λίτρα.	Πλαστικό τύπου COEX, SELLAR, PET ή αλουμίνιο

- 3 Οδηγίες χρήστης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-40 λίτρα νερό στο στρέμμα. Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm)

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα  $\frac{3}{4}$  με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Συνδυαστικότητα:** Συνδυασμός με ζιζανιοκτόνα πλατύφυλλων ζιζανίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας και πρέπει να αποφεύγεται.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας (φιάλες και δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων

## 5 5.1 Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. / στρέμμα)	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑ ΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (lt/ στρέμμα)	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
<b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</b> Μηλιά <b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</b> Ροδακινιά <b>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</b> Φράουλα <b>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</b> Καρότο, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Τομάτα, Πιπεριά, Πεπόνι, Κολοκύθι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Ραδίκι, Σέλινο, Φασόλι, Μπιζέλια, Αρακάς <b>ΟΣΠΡΙΑ:</b> Φακές, Κουκιά, Ρεβύθια <b>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</b> Σόγια, Ηλίανθος, Βαμβάκι <b>ΠΑΤΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ:</b> Ζαχαρότευτλα, Καπνός, Μηδική <b>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ</b>	Ετήσια Αγρωστώδη ζιζάνια (1α)  Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια (1β)	100 – 150  200 - 300	30-40  30-40	1	Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 2–3 φύλλων μέχρι το αδέλφωμα των ζιζανίων και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια.

### Παρατηρήσεις

#### (1) Καταπολεμούμενα Ζιζάνια

(α) **Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια:** *Alopecurus spp.* (Αλεπονουρές), *Apera spicaventis* (Ανεμόχορτο), *Bromus spp.* (Βρώμη), *Dactylis spp.* (Δακτυλίδες), *Digitaria sanguinalis* (Αιματόχορτο), *Echinochloa crus-galli* (Μουχρίτσα), *Eleusine indica* (Ελευσίνη), *Hordeum spp.* (Κριθάρια), *Lolium spp.* (Ηρες), *Phalaris spp.* (Φαλαρίδες), *Panicum spp.* (Πάνικο), *Setaria spp.* (Σετάριες), *Sorghum halepense* (Βέλιουρας από σπόρο), *Triticum spp.* (Σιτάρια).

(β) **Πολυετή Ζιζάνια:** *Agropyron repens* (Αγρόπυρο), *Agrostis stolonifera* (Αγρωστις), *Cynodon dactylon* (Αγριάδα), *Paspalum spp.* (Πάσπαλο), *Sorghum halepense* (Βέλιουρας από ριζώματα).

**2. Ανθεκτικά ζιζάνια:** Όλα τα πλατύφυλλα.

**3. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά.**

**4. Χρόνος Εφαρμογής:**

Τα *Cynodon dactylon* καταπολεμείται καλύτερα όταν έχουν ύψος 15 – 20 εκατοστά.

Το *Sorghum halepense* καταπολεμείται καλύτερα όταν έχει μήκος βλαστού 45 – 50 εκατοστά.

Η *Poa annua* (ετήσια Πόα) καταπολεμείται όταν έχει 1 – 4 φύλλα και σε δόση 300 κ.εκ./στρέμ.

**5. Να μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.**

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:**

**SZ1** - Φυλάξτε το χωριστά από γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

**SZ2** - Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

**SZ5** - Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

**SZ7** - Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

**SZ8** - Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.

**SZ11** - Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται

**SZ12** - Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

Μη χρησιμοποιήστε άλλο φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

---

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε σιτηρά πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή του.

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στις μη εύρωστες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

**9** Σήμανση σκευάσματος:

**Xn** - Επιβλαβές  
**N** - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**10** Φράσεις R

**R20** - Επιβλαβές όταν εισπνέεται.  
**R38** - Ερεθίζει το δέρμα.  
**R41** - Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.  
**R43** - Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.  
**R65** - Επιβλαβές: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.  
**R50/53** - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**11 Φράσεις S**

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές.
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- S24** Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.
- S37/39** Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- S60** Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα
- S61** Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- S62** Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.
- SP1** Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»**

**12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο****Πρώτες βοήθειες – αντίδοτο:**

**S46** Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.

Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα, όπου είναι δυνατόν). Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα.

**S26** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυνθείτε με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυνθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (210) 7793777**

**13 Προστασία των καταναλωτών****13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)**

Quinalofop-p-ethyl

Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005.	

**13.2 Τελευταία επέμβαση**

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	PHI(ημέρες)
Κολοκύθι	7
Μηδική	21
Μαρούλι, Σπανάκι, Καρότο, Φακές, Κουκιά, Ρεβόθια	21
Ηλίανθος, Καπνός, Μηλιά, Ροδακινιά, Πατάτα, Φασόλι, Φράουλα	35
Ραδίκια, Μπιζέλια, Σκόρδο	49

Τομάτα, Λάχανο, Πεπόνι, Πιπεριά	56
Ζαχαρότευτλα, Σόγια	60
Αρακάς, Κρεμμύδι, Σέλινο	70
Βαμβάκι	80

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευασμάτος

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και τη άμεση έκθεσή του στο ηλιακό φως . Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

## **15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **31-05-2012** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

### **B Γενικές υποχρεώσεις**

- Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
- Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευασμάτος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
- Η ετικέτα του σκευασμάτος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
- Η διαφήμιση του σκευασμάτος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευασμάτος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

### **Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

### **I. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ**

