



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/110118
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 25-2-2014

Αριθ. πρωτ.: 2158/26421

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249

ΠΡΟΣ: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
151 25 Μαρούσι

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης
στην αγορά στο βιοκτόνο προϊόν
(εντομοκτόνο) QUICK BAYT SPRAY.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ.1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
5. Τη με αριθ. 10847/108152/22-10-2012 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18- 0026 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο QUICK BAYT.
6. Το από 30-1-2014, σημείωμα του εργαστηρίου βιολογικού ελέγχου του ΜΦΙ.
7. Την από 9-11-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας με το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0108** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** QUICK BAYT SPRAY
2. **Μορφή:** εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** imidacloprid 10% β/β
muscalure 0.84% β/β
Βοηθητικές ουσίες 89,59% β/β
4. **Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:**
imidacloprid 97% min muscalure 84%
5. **α. Παρασκευαστές των δ.ο.:** imidacloprid, Bayer SAS Environmental Science, Γαλλία και muscalure, Denka International B.V. Ολλανδία
β. Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.: Bayer CropScience AG, Γερμανία και Denka International B.V. Ολλανδία.
γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-20, Μαρούσι.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Bayer SAS Environmental Science, Γαλλία
8. **Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:** α. SBM Formulation, Γαλλία.
β. KWIZDA Agro GmbH, Αυστρία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** IRIS, Γαλλία.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Σακούλες και φιάλες των 100, 200, 250, 300, 350, 500 γραμμαρίων και 1 κιλού σε κουτί ή όχι.
Υλικό συσκευασίας: Σακούλες από PE ήAlu και PE, φιάλες από HDPE, κουτί από χαρτόνι.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση της οικιακής μύγας (*musca domestica*).

12. **Τρόπος εφαρμογής: Μόνο από επαγγελματίες χρήστες**

α) Ψεκασμός : Διαλύονται 250 γρ. σκευάσματος σε 2 λίτρα νερό και ψεκάζονται επιφάνειες (τοιχών, περβαζιών) στις οποίες συνήθως κάθονται οι μύγες. Για την κάλυψη μιας τέτοιας επιφάνειας 100τ.μ., αρκεί ο ψεκασμός επιφανειών 40 τ.μ.

β) Ως επίχρισμα διαλυμένου σκευάσματος: Το σκεύασμα αναμιγνύεται με χλιαρό νερό σε αναλογία **1:0,8 (250 γρ σκευάσματος σε 200 γρ νερό)**. Εφαρμόζετε το διάλυμα με πινέλο σε επιφάνειες όπου συνήθως κάθονται οι μύγες. Το μέγεθος των επιφανειών που θα επιστρωθούν να είναι 10 x 20 εκ. περίπου. Αν δεν υπάρχουν κατάλληλες επιφάνειες για επίστρωση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σανίδες ή χαρτόνια και να κρεμαστούν στα σημεία που συχνάζουν οι μύγες.

Παρατηρήσεις:

1. Αποφύγετε να μεταχειριστείτε επιφάνειες προσιτές σε ανθρώπους και ζώα
2. Αποφύγετε να εφαρμόσετε σε σημεία δροσερά και ξηρά γιατί οι μύγες προτιμούν τα θερμά σημεία.
3. Προστατέψτε τα σημεία εφαρμογής από το νερό και τη βροχή.
4. Εφαρμόστε το σκεύασμα νωρίς, πριν αναπτυχθούν μεγάλοι πληθυσμοί.

- 13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με την απαιτούμενη ποσότητα νερού, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα QUICK BAYT SPRAY και ανακατέψτε το περιεχόμενο.

14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στάβλοι και κτηνοτροφικές μονάδες	οικιακή μύγα (musca domestica).	250γρ/100τμ	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1-6-2015 και προαιρετικά νωρίτερα..

15. Εικονογράμματα κινδύνου**16. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή****17. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

18. Δηλώσεις προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P220 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπική νομοθεσία.

19. Πρώτες Βοήθειες:

Γενικά: Μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ήρεμο. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό ακόμη και κάτω από τα βλέφαρα για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά τα 5 πρώτα λεπτά και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εμφανιστεί επίμονος ερεθισμός.

Σε περίπτωση κατάποσης: Προκαλέστε εμετό μόνο εάν: 1. ο ασθενής έχει πλήρως τις αισθήσεις του, 2. δεν υπάρχει ιατρική βοήθεια άμεσα διαθέσιμη, 3. έχει καταποθεί ικανή ποσότητα. 4. δεν έχει περάσει περισσότερο από 1 ώρα από τη στιγμή της κατάποσης (σε περίπτωση εμετού αποφύγετε την εισρόφηση του υγρού στην αναπνευστική οδό). Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Πληροφορίες για το γιατρό:

Θεραπευτικά μέτρα :

Συμπτωματική θεραπεία. Ελέγχετε την αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία.

Η πλύση στομάχου συνιστάται στην περίπτωση κατάποσης σημαντικής ποσότητας . Σε περίπτωση κατάποσης προτείνεται η χορήγηση ενεργού άνθρακα και sodium sulfate.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 10 7 793 777

20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

21. Απαγορεύσεις:---**22. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση του μόνο από καταστήματα γεωργικών φαρμάκων.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι, να καταχωρηθεί η δραστική ουσία muscalure που περιέχεται στο **QUICK BAYT SPRAY**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ.2 .

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ