

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.04.2018  
Αριθ. πρωτ: 3412/48054

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
FAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  
e-mail: [navramidis@minagric.gr](mailto:navramidis@minagric.gr)

Προς: ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S,  
(δια της αντιπροσώπου εταιρείας  
Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.  
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι,  
Τ.Κ. 15233)  
email: [info@arystalifescience.gr](mailto:info@arystalifescience.gr)

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 70276 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SELECT 12 EC (δ.ο. clethodim 12% β/ο) ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) καθώς επίσης και την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά»**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &amp; ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 87/2012, της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας **clethodim**.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
6. Την υπ' αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β'/01.03.2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7. Τη με αριθμό πρωτ. και 3769/52227/05.04.2018 αξιολόγηση (Registration Report) της ΑΑΑ για το προϊόν.  
8. Τις με αριθμό πρωτ. 3412/48054/29.03.2018 και 4125/56743/19.04.2018 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την με αριθμό 70276 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SELECT 12 EC (δ.ο. clethodim 12% β/ο), που χορηγήθηκε με την υπ. αριθμό πρωτ. 10233/99269/20.03.2018 απόφασή μας, ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) καθώς επίσης και την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά.

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.4<sup>β)</sup>, 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

## 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.**  
**Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233**  
**Τηλ.: 210 5578777**  
**Fax: 210 5578768**  
**e-mail: [info@arystalifescience.gr](mailto:info@arystalifescience.gr)**

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ/ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Καρότο (DAUCA)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100	20 -40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιεργείας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, από τα 3 -4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος. (BBCH 12-45)	1
	Βέλιουρας <i>Sorghum Halepense</i> (SORHA)	200	20 -40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιεργείας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν ο βέλιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-45)	
Κρεμμύδι (ALLCE)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100-150	20 -40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιεργείας, μέχρι ο βολβός να φτάσει στο 50% της τελικής του διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή	1

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

				ανάπτυξη, από τα 3 -4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος. (BBCH 12-45)	
	Βέλιουρας <i>Sorghum Halepense</i> (SORHA)	200	20 -40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι ο βολβός να φτάσει στο 50% της τελικής του διαμέτρου και όταν ο βέλιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-45)	
Ηλιάνθος (HELAN)  Βαμβάκι (GOSHI)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100-150	20 -40	Ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, από τα 3 -4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος. (BBCH 12-19)	1
	Βέλιουρας <i>Sorghum Halepense</i> (SORHA)	200-250	20 -40	Ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας και όταν ο βέλιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-19)	
	Άλλα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	250-300	20 -40	Ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας και όταν τα ζιζάνια είναι 15 εκ. (BBCH 12-19)	
Πατάτα (SOLTU)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100-150	20 -40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι να κλείσει το 30% της γραμμής και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, από τα 3 -4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος. (BBCH 12-33)	1
	Βέλιουρας <i>Sorghum Halepense</i> – (SORHA)	200-250	20 -40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι να κλείσει το 30% της γραμμής και όταν ο βέλιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-33)	
	Άλλα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	250-300	20 -40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι να κλείσει το 30% της γραμμής και όταν τα ζιζάνια είναι 15εκ. (BBCH 12-33)	

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ζαχαρότευτλα (ΒΕΑΒΑ) Κτηνοτροφικά τεύτλα (ΒΕΑΒC)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100 - 150	20 -40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, από τα 3 -4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος. (BBCH 12-33)	1
	Βέλιουρας <i>Sorghum Halepense</i> – (SORHA)	200		Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν ο βέλιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-33)	
	Άλλα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	250 – 300		Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια είναι 15 εκ. (BBCH 12-33)	
Σκόρδο (ALLSA)  (Χρήση ήσσονος σημασίας)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100-150	20 -40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι ο βολβός να φτάσει στο 50% της τελικής του διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, από τα 3 -4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος. (BBCH 12-45)	1
	Βέλιουρας <i>Sorghum Halepense</i> (SORHA)	200	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι ο βολβός να φτάσει στο 50% της τελικής του διαμέτρου και όταν ο βέλιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-45)	

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η υγρασία και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του.
2. Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης των ζιζανίων. Οι μεγάλες δοσολογίες εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης και οι χαμηλές στο μικρότερο στάδιο ανάπτυξης.
3. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια σκόρδου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του επομένως η χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Ευαίσθητα ζιζάνια:**Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:

Αγριοβρώμη (*Avena barbata* – AVEBA)  
 Αγριοβρώμη (*Avena fatua* – AVEFA)  
 Αγριοβρώμη (*Avena sativa* – AVESA)  
 Άγριο ρύζι (*Oryza sp.* – ORYSS)  
 Αλεπονουρά (*Alopecurus pratensis* – ALOPR)  
 Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* – DIGSA)  
 Βρόμος (*Bromus erectus* – BROER)  
 Λειβαδοπόα (*Poa pratensis* – POAPR)  
 Λεπτή ήρα (*Lolium rigidum* – LOLRI)  
 Λεπτόχλοα (*Leptochloa caerulea* – LEFCA)  
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* – ECHCG)  
 Πολύανθη ήρα (*Lolium multiflorum* – LOLMU)  
 Σετάρια (*Setaria verticillata* – SETVE )  
 Φάλαρη (*Phalaris brachystachys* – PHABR)

**Ευαίσθητα ζιζάνια:**Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια:

Αγριάδα (*Cynodon dactylon* – CYNDA )  
 Αγρόπυρος (*Agropyron repens* – AGRRE)  
 Βέλιουρας (*Sorghum halepense* – SORHA)  
 Νεραγριάδα (*Paspalum distichum* – PASDS)  
 Πολυετής ήρα (*Lolium perenne* – LOLPE)

**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**

Πόα κοινή (*Poa annua* – POAN)

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Καρότο	40
Ζαχαρότευτλα ,Κτηνοτροφικά τεύτλα, Κρεμμύδι, Πατάτα, <b>σκόρδο</b>	<b>56</b>
Βαμβάκι, Ηλίανθος	100

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 10233/99269/20.03.2018 απόφασή μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ