



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 07-3-2013
Αριθ. πρωτ:638/6911

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 928 7250
e-mail: syg061@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς ΑΒΕΕ
Α. Μεσογείων 449
153 43 Αγία Παρασκευή
Αθήνα

ΘΕΜΑ: « Διεύρυνση της με αριθ. 60098 οριστικής
άδειας διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(μυκητοκτόνο) **SIGNUM 26.7/6.7 WG**»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο**

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων

δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες boscalid/pyraclostrobin

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
8. Την με αριθ. με αριθ. 60.098 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SIGNUM 26.7/6.7 WG** η οποία χορηγήθηκε με την με αριθ. 95706/13-4-2011 απόφαση μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τη με αριθ. 280665/6.4.2009 (Β' 970) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»»
10. Την με αριθ. Πρωτ. 19-8-2011 αίτηση της εταιρείας **BASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε διεύρυνση στη με αριθ. 60098 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SIGNUM 26.7/6.7 WG** (μυκητοκτόνο) σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καν. 1107/2009 με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

| |
|-------------------|
| 60098 |
| 07-03-2013 |
| 31-01-2018 |

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

| |
|---------------------------|
| SIGNUM 26.7/6.7 WG |
|---------------------------|

1.2.β Μορφή¹:

| |
|---|
| Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG) |
|---|

1.3 Δραστική ουσία (ες)²

α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσιών/ών κατά ISO³

| |
|---|
| Boscalid, (ομάδα καρβαμδικά) Pyraclostrobin (ομάδα μεθοξυκαρβαμδικά) |
|---|

¹ Κατά GIFAP π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, (SP), υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) κ.λ.π.

² Σε περίπτωση σκευασμάτων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, οι πληροφορίες θα επαναλαμβάνονται για την κάθε δραστική ουσία

³ Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινή κατά ISO ονομασία της δραστικής ουσίας, δίνεται η χημική της ονομασία κατά IUPAC ή CA.

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

| |
|--|
| Boscalid: 96 % (β/β) min Pyraclostrobin: 97.5% (β/β) min |
|--|

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

| |
|--|
| Boscalid – Pyraclostrobin : BASF SE 67056 Ludwigshafen Germany Crop Protection Division: P.O. Box 120 67114 Limburgerhof Germany |
|--|

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.⁴

| |
|--|
| Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Boscalid: BASF S/A Av. Brasil, 791 Guaratinguetá - SP 12521-900 Brazil Pyraclostrobin: BASF Schwarzheide GmbH Schipkauer Strasse 1 01986 Schwarzheide Germany |
|--|

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

| |
|---|
| Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών Boscalid και Pyraclostrobin προσδιορίζονται στο Doc J της αίτησης με ημερομηνία 6-8-2009 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 131453) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. |
|---|

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης⁵:

| |
|---|
| BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Λ.Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή ΑΜΕ ⁶ : BASGR Τηλ.:2106860120 Fax:2106860200 E-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr |
|---|

⁴ Αναγράφεται η διεύθυνση του κατόχου του εργοστασίου. Τα στοιχεία που αφορούν την διεύθυνση του εργοστασίου παραμένουν στα αρχεία της υπηρεσίας.

⁵ Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.

β) Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά (εφόσον ο κάτοχος της έγκρισης δεν έχει έδρα στη χώρα)

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Λ.Μεσογείων 449,
153 43 Αγία Παρασκευή

ΑΜΕ⁷: BASGR
Τηλ.:2106860120
Fax:2106860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF SE
67056 Ludwigshafen
Germany
Crop Protection Division:
P.O. Box 120
67114 Limburgerhof
Germany

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1) IPT Pergande GmbH
Wilfried Pergande Platz 1
D-06369 Weibandt- Gölzau,
Γερμανία
2) SBM-Formulation
C.S. 621
Av. Jean Foucault - Z.I.
34535 Beziers Cedex / France

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1) IPT Pergande GmbH
Wilfried Pergande Platz 1
D-06369 Weibandt- Gölzau,
Γερμανία
2) SBM –FORMULATION
Ave. Jean Foucault Z.I.
F-34535 BÉZIERS
Γαλλία
3) BASF SE
Carl-Bosh- Straße 38
67063 Ludwigshafen am Rhein
Gebäude M920
Γερμανία
4) Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
570 22 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
e-mail: l.paparistotelous@redestos.gr

⁶ Αριθμός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ). Δίδεται από την Αρμόδια Αρχή.

⁷ Αριθμός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ). Δίδεται από την Αρμόδια Αρχή.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Boscalid 26.7 % (β/β)
 Pyraclostrobin 6.7 % (β/β)
 Βοηθητικές ουσίες 65.3 % β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Part C (core dossier) της παρούσας αίτησης.

2

Συσκευασία(ες)

2.1 Συσκευασία(ες):

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|-----------------------------|---|---|
| 1. | Κουτιά με εσωτερική σακούλα | 200 γρ., 300 γρ., 350 γρ., 500 γρ., 700 γρ., 1 κιλού και 5 κιλών. | Χάρτινο κουτί με εσωτερική σακούλα από χαρτί/πολυαιθυλένιο ή PET/PE (πολυαιθυλένιο εσωτερικά) |
| 2. | Φιάλες | 200 γρ., 300 γρ., 350 γρ., 500 γρ., 700 γρ., 1 κιλού και 5 κιλών. | HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |
| 3. | Σακούλες | 200 γρ., 300 γρ., 350 γρ., 500 γρ., 700 γρ., 1 κιλού και 5 κιλών. | PET/PE (πολυαιθυλένιο εσωτερικά) |

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς και σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Συνδυαστικότητα:

Καθαρισμός Ψεκαστήρα: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με προληπτική και κατά περίπτωση θεραπευτική δράση που παρεμποδίζει την βλάστηση των σποριών, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση.
Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, ενώ το boscalid παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (σύμπλοκο II) και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση.

5 5.1 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|-----------------------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|
| | | γρ/ στρέμμα (max) | γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρο ύ | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα | | |
| Ροδακινιά Νεκταρινιά | Μονίλια (<i>Monilinia laxa</i>) | 60-75 | 60-75 | 100 | Από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων και κατά την ανάπτυξη των καρπών. | Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| | Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) | 60 | 60 | | | |
| Βερικοκιά | Μονίλια (<i>Monilinia laxa</i>) | 60-75 | 60-75 | 100 | Από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων και κατά την ανάπτυξη των καρπών. | Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| | Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) | 60 | 60 | | | |
| Λαμασκηλιά | Μονίλια (<i>Monilinia laxa</i>) | 60-75 | 60-75 | 100 | Από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων και κατά την ανάπτυξη των καρπών. | Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| | Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) | 60 | 60 | | | |
| Κερασιά | Μονίλια (<i>Monilinia laxa</i>) | 60-75 | 60-75 | 100 | Από την έναρξη της άνθησης έως | Μέχρι 3 εφαρμογές με |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|---------|-----|---|---|
| | Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) | 60 | 60 | | την πτώση των πετάλων. | μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| Φράουλα* (Θ) | Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>) | 135-150 | 135-150 | 100 | Από την έναρξη της άνθησης μέχρι την ωρίμανση των καρπών. | Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| | Ωίδιο (<i>Sphaerotheca macularis</i>) | 75-100 | 75-100 | | | |
| Καρότο* (Υ) | Ωίδιο (<i>Erysiphe heraclei</i>) | 60-80 | 100 | 80 | Κατά την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος | Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| | Αλτερνάρια (<i>Alternaria dauci</i>) | | 75 | | | |
| Τομάτα, Πιπεριά* (Υ + Θ) | Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>) | 100-150 | 100-150 | 100 | Έναρξη ψεκασμών με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Η μεγαλύτερη δόση θα πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από έντονες συνθήκες προσβολής. | Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| | Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>) | | | | | |
| Μαρούλι* (Υ) | Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>) | 60-75 | 120-150 | 50 | Στην περίοδο της έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας | Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| | Σκληρωτόνια (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) | | | | | |
| Σπαράγγι | Σκωρίαση (<i>Puccinia asparagi</i>) | 75-100 | 75-100 | 100 | Από την έναρξη της άνθησης μέχρι τη γήρανση του υπέργειου τμήματος | Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται |

| | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|--|--|
| Κρεμμύδι, Σκόρδο (Υ) | Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>), Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i>) | 150 | 150 | 100 | Από το στάδιο της πάχυνσης της βάσης των φύλλων μέχρι την ανάπτυξη του ανθικού στελέχους. | Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| Αμυγδαλιά | Μονίλια (<i>Monilinia spp.</i>), Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i>) | 100 | 67-100 | 100-150 | Από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. | Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| Φιστικιά | Καμαροσπόριο (<i>Botryosphaeria dothidea</i>) | 75-100 | 50-100 | 100-150 | Από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. | Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| Κουκιά (φρέσκα) Φασόλια χωρίς λοβό (φρέσκα) (Υ) | Βοτρύτης (<i>Botrytis spp.</i>), Σκληρωτία (<i>Sclerotinia spp.</i>), Σκωρίαση (<i>Uromyces spp</i>) | 100-150 | 100-385 | 40-100 | Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου μέχρι και το τέλος της άνθισης. | Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| Σπανάκι | Ανθράκνωση (<i>Colletotrichum sp.</i>), Περονόσπορος (<i>Peronospora sp.</i>), Κλαδοσπόριο (<i>Cladosporium sp.</i>) | 75-100 | 75-250 | 40-100 | Από την εμφάνιση του 4ου φύλλου, μέχρι το φυτό να αποκτήσει το φυτό να αποκτήσει το τελικό του μέγεθος | Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| Αρωματικά φυτά (Βασιλικός) (Θ) | Σκληρωτία (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), (<i>Botrytis cinerea</i>) | 150 | 150-375 | 40-100 | Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου, μέχρι το 70% της ανάπτυξης των φύλλων του φυτού. | Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται |

| | | | | | | |
|--|-------|--------|---------|--------|--|---|
| Καλλωπιστικά (Τριαντάφυλλο) (Θ) | Ωίδιο | 80-150 | 150-375 | 40-100 | Από την εμφάνιση του 3 ^{ου} φύλλου, μέχρι το τέλος της άνθισης. | Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται |
|--|-------|--------|---------|--------|--|---|

Παρατηρήσεις:* Όταν είναι παρόντα και τα δυο παθογόνα, συνιστάται η μεγαλύτερη δόση.

- 1) Να γίνονται προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
- 2) Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων
- 3) **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι μεγάλες δόσεις στο εκατόλιτρο να εφαρμόζονται με τις χαμηλές δόσεις ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα.
- 4) Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
- 5) Η χρήση σε φασόλια με λοβό (φρέσκα) και μπιζέλια θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν αναθεωρημένα MRLs για το pyraclostrobin σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο | ΡΗΙ (Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή) |
|--|--|--------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| | | γρ./ στρέμμα | γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα | | | |
| Ψυχανθή Μπιζέλια (φρέσκα) (Υ) | Ασκοχύτωση (<i>Ascochyta pisi</i>) Ωίδιο (<i>Erysiphe spp.</i>), Περονόσπορος (<i>Peronospora spp.</i>), Σκληρωτία (<i>Sclerotinia spp.</i>), | 100-150 | 100-385 | 40-100 | Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση. | Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται | 7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|--|---|---|
| Ψυχανθή Φασόλια με λοβό (φρέσκα) (Υ) | Βοτρύτης (<i>Botrytis spp.</i>), Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia spp.</i>), Σκωρίαση (<i>Uromyces spp</i>) | 100-150 | 100-385 | 40-100 | Από την εμφάνιση του 5ου φύλλου μέχρι και το τέλος της άνθισης. | Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται | 7 |
|---|---|---------|---------|--------|--|---|---|

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Στρατηγική διαχείρισης ανθεκτικότητας

- Εφαρμόστε το SIGNUM 26.7/6.7 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και περιορίστε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
- Εφαρμόστε το SIGNUM 26.7/6.7 WG σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το Σκεύασμα

| |
|----|
| -- |
| -- |
| -- |

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής **εκτός από τα κουκιά στα οποία συνιστάται η δοκιμή φυτοτοξικότητας**

9 Σήμανση σκευάσματος:

Xn – Επιβλαβές
N- Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

11 Φράσεις S

S1/2 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

«Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια.»

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό»

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή 15 μέτρων με ακροφύσια μειωμένης διασποράς (75%) από τα επιφανειακά ύδατα για την αμυγδαλιά και τη φιστικά, 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τα ψυχανθή και 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις υπόλοιπες καλλιέργειες.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

12 Πρώτες βοήθειες -

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

| | |
|----------|---|
| Αντίδοτο | <p>Αποφύγετε επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Εάν εμφανιστούν προβλήματα ζητήστε ιατρική συμβουλή Δείξτε την συσκευασία /ετικέτα στον γιατρό.</p> <p><u>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</u> Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.</p> <p><u>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</u> Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.</p> <p><u>Σε περίπτωση κατάποσης:</u> Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά να πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλείτε εμετό και μην δίνετε τίποτα από το στόμα αν ο ασθενής είναι αναίσθητος ή έχει σπασμούς.</p> <p>Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.</p> <p><u>Σε περίπτωση εισπνοής:</u> Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο, απομακρύνετε τον σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p>Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.</p> <p>ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777</p> |
|----------|---|

13

Προστασία των καταναλωτών

13.1 Για τις καλλιέργειες μπιζέλια (φρέσκα), φασόλια με λοβό, σπανάκι , δεν έχουν καθοριστεί προς το παρόν από ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) για το pyraclostrobin σύμφωνα με την αιτούμενη Ο.Γ.Π.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Καλλιέργειες | PHI(ημέρες) |
|-------------------------|-------------|
| Αμυγδαλιά | 28 |
| Κερασιά | 7 |
| Ροδακινιά Νεκταρινιά | 7 |
| Βερικοκιά | 7 |
| Δαμασκηνιά | 7 |
| Φιστικά | 28 |
| Φράουλα (Θ) | 3 |
| Καρότο (Υ) | 14 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Τομάτα (Υ + Θ) | 3 |
| Πιπεριά (Υ + Θ) | 3 |
| -Μαρούλι (Υ) | 7 |
| Σπαράγγι (Υ) | Μη εφαρμόσιμο (>120 ημέρες) |
| -Κρεμμύδι (Υ) -Σκόρδο (Υ) | 14 |
| Σπανάκι | 14 |
| -Φασόλι (χωρίς λοβό) (φρέσκα) (Υ) -Κουκιά (φρέσκα) (Υ) | 7 |
| Αρωματικά φυτά Βασιλικός (Θ) | 14 |
| Καλλωπιστικά (Θ) | Μη εφαρμόσιμο |

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος⁸.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

⁸ Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι μικρότερη των δύο (2) ετών

Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

1. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να προσκομίσει εντός 2 ετών από την υπογραφή της παρούσας τα απαιτούμενα στοιχεία αποτελεσματικότητας στις προτεινόμενες δόσεις εφαρμογής του πίνακας 5 για τις παρακάτω ασθένειες/καλλιέργειες :

- *Uromyces spp* σε φασόλια
- *Botrytis spp.*, *Sclerotinia spp.*, *Uromyces spp* στα κουκιά
- *Sclerotinia sclerotiorum* στα μπιζέλια
- *Sclerotinia sclerotiorum* στο βασιλικό

2. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να προσκομίσει εντός 2 ετών από την υπογραφή της παρούσας τα απαιτούμενα στοιχεία φυτοτοξικότητας στις προτεινόμενες δόσεις εφαρμογής του πίνακας 5 για τα κουκιά.

Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Ο κάτοχος της άδειας εφόσον διαφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης, μπορεί να υποβάλει ένσταση στην Συντονιστική Εθνική Αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ