



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 21.10.2019
Αριθ. πρωτ: 10598/255444

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
(Παραδείσου 2 & Κηφισίας
15125 Μαρούσι)

e-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70253 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) STRATOS 10 EC (cycloxydim 10% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμό πρωτ. 8076/78485/15.11.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70253 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) STRATOS 10 EC (cycloxydim 10% β/ο).
4. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγορίδου με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού", "με εντολή Υφυπουργού" ή "με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού", κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/σης, Προϊσταμένους Δ/σης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" (Β' 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 10598/255444/09.10.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70253 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) STRATOS 10 EC (cycloxydim 10% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 8076/78485/15.11.2017 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
Μηλιά MABSD, Αχλαδιά ΡΥUCO, Κυδωνιά CYDOB Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο, σταφίδα) Πατάτα SOLTU Καρότο DAUCS, Χρένο ARWLA, Ραπανάκι RAPSR, Σελινόριζα APUGD, Παστινάκη PAVSA, Λαγόχορτο TROPS Κρεμμύδι ALLCE, Σκόρδο ALLSA,	<u>Αγρωστώδη Ζιζάνια</u>	200 ⁽¹⁾	-	15-40	Κάνετε ανοιξιάτικες – καλοκαιρινές εφαρμογές, μέχρι το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των καρπών.	1
		400 ⁽²⁾				
		500 ⁽³⁾				
					Κάνετε ανοιξιάτικες – καλοκαιρινές εφαρμογές, μέχρι το πλήρες κλείσιμο των σταφυλιών.	1
					Κάνετε εφαρμογές κατά την ανάπτυξη του υπέργειου τμήματος (BBCH 10-19)	1
					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3 ^{ου} φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του ριζώματος.	1
					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του	1

Ασκαλώνιο ALLCE, Φρέσκο κρεμ-μυδάκι ALLCE, Πράσο ALLPO					5 ^{ου} φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του βολβού.	
Τομάτα LYPES, Πιπεριά CPSAN, Μελιτζάνα SOLME					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 2 ^{ου} φύλλου ως την ανάπτυξη του 3 ^{ου} πλευρικού βλαστού.	1
Λευκό Λάχανο BRSOL, Λαχανάκια Βρυξελλών BRSOF, Φυλλώδεις κράμβες (Κινέζικο λάχανο BRSPK, Κόκκινο λάχανο BRSOR)					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3 ^{ου} φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του κεντρικού στελέχους.	1
Μαρούλι LACSA, Σκαρόλα LACSE, Λυκοτρίβολο VLLLO Κάρδαμο LEPSA, Κόκκινο Σινάπι BRSJU, Γαιοκάρδαμο BARVE, Σπανάκι SPCOL, Αντράκλα POROL, Αρωματικά φυτά					Κάνετε εφαρμογές από το 3 ^ο ως το 9 ^ο φύλλο.	1
Φασόλια (φρέσκα με λοβό) PHSVX, Φασόλι (ξερό) PHSVX, Μπιζέλι (ξερό) PIBSX, Φακές LENCU, Λούπινα LUPSS, Ρεβίθια CIEAR					Κάνετε εφαρμογές από το 3 ^ο σύνθετο φύλλο ως το στάδιο ανάπτυξης του 5 ^{ου} μεσογονατίου διαστήματος.	1
Ζαχαρότευτλο BEAVA, Κτηνοτροφικό τεύτλο BEAVC, Γογγύλι BRSNA,					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3 ^{ου} ζεύγους φύλλων ως την	1

Παντζάρι BEAVD					πλήρη ανάπτυξη της ροζέτας.	
Βαμβάκι GOSHI					Κάνετε εφαρμογές από το 2 ^ο φύλλο ως το στάδιο έκπτυξης όλων των πλάγιων βλαστών.	1
Ελαιοκράμβη BRSNP					Κάνετε εφαρμογές από το 3 ^ο φύλλο ως το στάδιο ανάπτυξης του 5 ^{ου} μεσογονατίου διαστήματος.	1
Σόγια GLXMA					Κάνετε εφαρμογές από το 4 ^ο ως το 9 ^ο σύνθετο φύλλο.	1
Ηλίανθος HELAN					Κάνετε εφαρμογές από το 2 ^ο ως το 8 ^ο φύλλο.	1

Παρατηρήσεις:

1) Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα:

α. ευαίσθητα: Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*)- ECHCG, Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*)- DIGSA, Βέλιουρας (*Sorghum halepense*)- DIGSA, Σετάρια (*Setaria spp.*)- SETSS, Βρόμος (*Bromus spp.*)- BROSS, Πάνικο (*Panicum dichotomiflorum*)- PANDI, Φάλαρη (*Phalaris spp.*)- PHASS, Λεπτόχλοα (*Leptochloa fascicularis*)- LEFFA, Φεστούκα (*Festuca spp.*)- FESSS, Φυτά-εθελοντές σιταριού, κριθαριού και βρώμης, Άγρια είδη κριθαριού (*Hordeum spp.*) και βρώμης (*Avena spp.*)- TRZSS, HORSS, AVESS,

β. μετρίως ευαίσθητα: Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*)- ALOMY, Πολύανθη ήρα (*Lolium multiflorum*)- LOLMU.

2) Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 400 κ.εκ./στρέμμα:

α. ευαίσθητα: Κόκκινο ρύζι (*Oryza rufipogon*)- ORYRU, β. μετρίως ευαίσθητα: Αγριάδα (*Cynodon dactylon*)- CYNDA

3) Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 500 κ.εκ./στρέμμα:

α. μετρίως ευαίσθητα: Αγρόπυρο (*Agropyron repens*)- AGRRE

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα, Φασόλι (ξηρό), Μπιζέλι (ξηρό), Φακές, Λούπινα, Ρεβίθια, Σόγια	56
Τομάτα, Μελιτζάνα, Λαχανάκια Βρυξελλών, Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο, σταφίδα), Φυλλώδεις κράμβες (Κινέζικο λάχανο, Κόκκινο λάχανο), Φρέσκο κρεμμυδάκι, Πράσο.	42
Καρότο, Ραπανάκι	35
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Φασόλια (φρέσκα με λοβό), Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνιο, Σπανάκι, Λευκό Λάχανο, Αντράκλα, Αρωματικά φυτά	28
Πυπεριά, Μαρούλι, Σκαρόλα, Λυκοτρίβολο, Κάρδαμο, Κόκκινο Σινάπι, Γαιοκάρδαμο	21
Βαμβάκι	Δεν ορίζεται
Παντζάρι, Σελινόριζα, Χρένο, Παστινάκη, Λαγόχορτο, Ελαιοκράμβη, Ζαχαρότευτλο, Κτηνοτροφικό τεύτλο, Γογγύλι, Ηλίανθος.	Ορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 8076/78485/15.11.2017 απόφασή μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ