



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 7 - 12 - 2011
Αριθ. πρωτ: 103053

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090

Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228
e-mail: svy064@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.
6989/27-1-2005 έγκρισης στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνο) SYLLIT 400 SC
(δ.ο.dodine) ως προς το εργοστάσιο
συσκευασίας και την ημερομηνία
λήξης της έγκρισης.»

Προς: AGRIPHAR SA, Βέλγιο
Δια της ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ
Λεωφ. ΝΑΤΟ, 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
(με απόδειξη)

Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού κ. Κ.
Σκανδαλίδη
2. Γραφείο Υφυπουργού
κ. Ι. Δριβελέγκα
3. Περιφερειακές Ενότητες
Δ/σεις Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Έδρες τους
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους
6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
8 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού.
2. Την Οδηγία 2011/9/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία **dodine** ως δραστική ουσία και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής.

3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
4. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α’).
5. Τη με αριθ. πρωτ. 97975/10-6-2011 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. **6989** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **SYLLIT 400 SC** (δ.ο.dodine) της εταιρείας AGRIPHAR SA, που χορηγήθηκε με την αριθ. 120830/27-1-2005 Υπ. απόφαση, ως προς το εργοστάσιο συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

6989
27-1-2005
31 - 05 - 2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

SYLLIT 400 SC
Συμπκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία (εξ)

- α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

dodine Χημική ομάδα: γουανιδίνες
--

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

dodine: 95% (β/β) min

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

AGRIPHAR SA Rue de Renory 26/1 B-4102 Ougrée, Belgium Βέλγιο

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: RUDONG HUASHENG CHEMICAL Co. Ltd, Κίνα (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας dodine όπως έχουν κατατεθεί από την Παρασκευάστρια Εταιρεία AGRIPHAR SA Βελγίου, κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 10-6-2011 (Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 97974) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

AGRIPHAR SA
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougrée, Belgium
Τηλ.: +32/4.387.97.46
Fax: +32/4.387.97.49
E-mail: christophe.corman@agriphar.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ
Λεωφ. ΝΑΤΟ, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ.: 210-5578777
Fax: 210-5578768
Email: info@geopharm.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

Ο κάτοχος της έγκρισης
AGRIPHAR SA

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

AGRIPHAR SA
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougrée, Belgium

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
CHIMAC SA, Βέλγιο
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1. CHIMAC SA, Βέλγιο
2. ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, Λ. Νάτο Ασπρόπυργος Αττικής

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: dodine 40% β/β
Βοηθητικές ουσίες 59% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση της εταιρείας με ημερομηνία 16-7-2004 (Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 109233) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2 Συσσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	100, 200, 250, 500, 700, 750 κ.εκ. & 1, (1.5) και 5 λίτρων.	Πολυαιθυλένιο HDPE, PET & COEX

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Να αποφεύγεται η χρήση σκληρού νερού.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση. Ειδικό για το Φουζικλάδιο Μηλιάς και Αχλαδιάς.

5 5.1 Φάσμα δράσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρό)	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ (λίτρα/στρ.)	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. / στρ.)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογ. ανά καλ/κή περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	100 (προληπτικά) 150-160 (θεραπευτικά)	100-200		2	Ψεκασμοί στην πράσινη κορυφή και στον πλήρη σχηματισμό των καρπών.

Αχλαδιά Μουσμουλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia pirina</i> , <i>Venturia eriobotryae</i>)	150 (προληπτικά) 160-190 (θεραπευτικά)	100-200		2	Ψεκασμοί στην πράσινη κορυφή και στον πλήρη σχηματισμό των καρπών.
Κερασιά Βυσσινιά	Ανθράκνωση (<i>Gnomonia erythrostoma</i> , <i>Coccomyces hielmalis</i>)	130-160	150-200		1	Ένας ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
Ελιά	Κυκλοκόνιο (<i>Spilocaea oleagina</i>)	160	150-300		2	Ο πρώτος ψεκασμός πριν την έναρξη των φθινοπωρινών βροχών και ο δεύτερος κατά το τέλος του χειμώνα πριν το κλάδεμα.
	Γλοιοσπόριο (<i>Gloeosporium olivarum</i>)	160	150-300			Λίγο πριν την έναρξη αλλαγής του χρώματος του ελαιοκάρπου.

Παρατηρήσεις:

- Για τη Μηλιά θεραπευτικά το πολύ 48 ώρες μετά την έναρξη της βροχής, εφόσον δημιουργούνται συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.
- Η δράση του στην καταπολέμηση του Κυκλοκόνιου και Γλοιοσπόριου της Ελιάς είναι μέτρια.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με ασβέστιο, θερινό πολτό και γενικά πολύ αλκαλικά σκευάσματα.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και

Φυτοτοξικότητα: Να μην ψεκάζεται σε αχλαδιές και μηλιές κατά τη διάρκεια της άνθησης ή αμέσως μετά την πτώση των

κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	πετάλων, εάν ο καιρός είναι πολύ ψυχρός (<5°C). Μπορεί να προκαλέσει εσχάρωση στην ποικιλία μηλιάς Golden Delicious
--	---

9 Σήμανση σκευάσματος:

Xi – Ερεθιστικό
N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R38 Ερεθίζει το δέρμα.
R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

11 Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Πρώτες Βοήθειες:
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα ανοικτά και πλύνετε τα με άφθονο νερό, συνέχεια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό. Η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει με την κατανάλωση αλκοόλ.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) dodine

Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 396/2005.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη

Καλλιέργεια	PHI(ημέρες)
Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά	15

πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Κερασιά, Βυσσινιά	15
Ελιά	15

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το προϊόν διατηρείται κλειστό, στην αρχική του συσκευασία, μακριά από πηγές θερμότητας και προστατευμένο από την υγρασία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **31-5-2013** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ