



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 26 - 09 -2018
Αριθ. πρωτ: 6237/85542**

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150

**Προς: ISK Biosciences Europe N.V (δια
της K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ)**

Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ

ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ

TELEFAX: 210 92 12 090

T.K. 57022

Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ

e-mail: l.vellis@efthymiadis.gr

Τηλέφωνο: 210 928 7237

e-mail: apapamichail@minagric.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. 14.511 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ΤΕΡΡΕΚΙ 50 WG (δ.ο. flonicamid) ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας»
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 4786/65494/07-05-2018 και 6237/85542/15-06-2018 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
7. Το υπ' αρ. 8832/115493/28-08-2018 έγγραφο του Μ.Φ.Ι. σχετικά με την έκθεση αξιολόγησης των αιτούμενων τροποποιήσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθ. **14.511** οριστική έγκριση διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) (**εντομοκτόνο**) **ΤΕΡΡΕΚΙ 50 WG (δ.ο. flonicamid)** που χορηγήθηκε με την με αριθ. **5078/59875/29-05-2015** απόφαση μας ως προς το φάσμα δράσης (επέκταση σε χρήση ήσσονος σημασίας) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/στρέμμα	γρ/100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιές (CIDSΙ), Μανταρινιές (CIDRE), Λεμονιές (CIDLI), Γκρεϊπφρουτ (CIDPA), Κιτριά (CIDME), Φράπες (CIDGR), Νεραντζιές (CIDAU), Περγαμόντο (CIDAB), Κουμκουάτ (FOΛΙΑ)	Αφίδες Εσπεριδοειδών <i>Aphis citricola</i> (APHISI), <i>Toxoptera auranti</i> (ΤΟΧΟΑΥ), <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)	10	3.5-10	100-300	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδακινιές (PRNPS),	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Hyalopterus pruni</i> (HYALPR), <i>Brachycaudus helichrysi</i> (ANURHE), <i>Brachycaudus</i>	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται

	<i>schwartzii</i> (APPESW)					
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Κερασιές (PRNAV)	Αφίδες <i>Myzus cerasi</i> (MYZUCE), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Brachycaudus helichrysi</i> (ANURHE), <i>Brachycaudus schwartzii</i> (APPESW), <i>Hyalopterus pruni</i> (HYALPR)	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Δαμασκηνιές (PRNDO)	Αφίδες <i>Hyalopterus pruni</i> (HYALPR) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Brachycaudus helichrysi</i> (ANURHE), <i>Brachycaudus schwartzii</i> (APPESW)	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μηλιές (MABSD)	Γκρίζα αφίδα <i>Dysaphis plantaginea</i> (DYSAPL), <i>Dysaphis pyri</i> (DYSAPY), <i>Eriosoma lanigerum</i> (ERISLA) Πράσινη αφίδα <i>Aphis pomi</i> (APHIPO)	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αχλαδιές (PYUCO), Αχλαδιές - NASHI	Αφίδες, γκρίζα αφίδα της αχλαδιάς	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της	3 εφαρμογές ανά 21

(PYUPC) Κυδωνιές (CYDOB),	<i>Dysaphis pyri</i> (DYSAPY), <i>Eriosoma lanigerum</i> (ERISLA)				προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	ημέρες εφόσον απαιτείται
ΣΟΛΑΝΩΔΗ Τομάτες (LYPES), Μελιτζάνες (SOLME) υπαίθρου	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU), <i>Macrosiphum sp.</i> (MACSSP), <i>Aphis fabae</i> (APHIFA)	10		50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. ⁽¹⁾	3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
ΣΟΛΑΝΩΔΗ Τομάτες (LYPES), Μελιτζάνες (SOLME) θερμοκηπίου	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU), <i>Macrosiphum sp.</i> (MACSSP), <i>Aphis fabae</i> (APHIFA)	10		50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. ⁽¹⁾ (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα).	3 εφαρμογές max (1 φυλλώ- ματος, 2 με στάγδην άρδευση) ανά 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
ΣΟΛΑΝΩΔΗ Τομάτες (LYPES), Μελιτζάνες (SOLME) θερμοκηπίου (εφαρμογές με στάγδην άρδευση)	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA)	16		200-500	Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα φύλλα ενάντια στις αφίδες. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός εφαρμογών είναι max 3 με δύο	

					επεμβάσεις στάγδην άρδευση και μία φυλλώματο.	
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ Αγγούρια (CUMSA), Αγγουράκια (CUMSA), Κολοκυθάκια (CUUPG) Θερμοκηπίου	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> (MACSEU), <i>Macrosiphum</i> <i>sp.</i> (MACSSP), <i>Aphis fabae</i> (APHIFA)	10		50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. ⁽¹⁾ (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα).	3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Πατάτες (SOLTU)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Aphis nasturtii</i> (APHINA), <i>Aphis frangulae</i> (APHIFG). <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> (MACSEU), <i>Aulacorthum</i> <i>solani</i> (AULASO)	16		20-50	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σιτάρι (TRZSS)	Αφίδες <i>Aphis nasturtii</i> (APHINA), <i>Macrosiphum</i> <i>avenae</i> (MACSAV) <i>Macrosiphum</i> <i>dirhodum</i> (MACSSP), <i>Metopolophium</i>	14		20-50	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών.	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται

	<i>dirhodum</i> (METODR), <i>Rhopalosiphum</i> <i>padi</i> (RHOPPA)					
Καπνός (ΝΙΟΤΑ)	Αφίδες <i>Myzus sp.</i> (MYZUSP)	14		40-60	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών.	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καπνός (ΝΙΟΤΑ) (εφαρμογή με ριζοπότισμα με το νερό της μεταφύτευσης) ⁽⁴⁾ Χρήση ήσσονος σημασίας (ΧΗΣ)	Αφίδες <i>Myzus nicotianae</i> (MYZUNI), <i>Myzus sp.</i> (MYZUSP), <i>Aphis sp.</i> (APHISP)	14		40-60	Εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση χωρίς την παρουσία μελισσών.	2 εφαρμογές max (1 εφαρμογή με ριζοπότισμα με το νερό της μεταφύτευσης και 1 εφαρμογή φυλλώματος μετά από 14 ημέρες) εφόσον απαιτείται
Βαμβάκι (GOSHI)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) Λύγκος <i>Lygus sp.</i> (LYGUSP) ⁽⁴⁾ Χρήση ήσσονος σημασίας (ΧΗΣ)	7.5		50-80	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αρακάς (με λοβό) (PIBSX) υπαίθρου ⁽⁵⁾ Χρήση ήσσονος σημασίας (ΧΗΣ)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Aphis fabae</i> (APHIFA)	14	35-70	20-40	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του 6 ^{ου} ξεδιπλωμένου φύλλου	1 εφαρμογή

					(BBCH16) χωρίς την παρουσία μελισσών.	
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (ΖΟΡΝΗ) Τριανταφυλλιές (ROSSS) υπαίθρου και θερμοκηπίου	Αφίδες Aphis gossypii (APHIGO), Myzus persicae (MYZUPE), Macrosiphum sp. (MACSSP), Aphis fabae (APHIFA)	14		50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών - εντόμων. ⁽¹⁾ (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα).	3 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ (ΖΟΡΝW)					Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών.	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- 1) Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
- 2) Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- 3) Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.
- 4) Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας: Βαμβάκι (*Lygus* sp.) και Καπνός (εφαρμογή με ριζοπότισμα με το νερό της μεταφύτευσης), δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα. Για την χρήση του σκευάσματος σε αυτές τις χρήσεις ήσσονος σημασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα από τη χρήση του.
- 5) Για τη χρήση ήσσονος σημασίας: Αρακάς (με λοβό) δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

13**Προστασία των καταναλωτών****13.2** Τελευταία επέμβαση

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	60
Μηλιές, Αχλαδιές, Κυδωνιές, Nashi	21
Ροδακινιές, Δαμασκηνιές, Κερασιές, Πατάτες , Αρακάς (με λοβό)	14
Αγγούρια, Αγγουράκια, Κολοκυθάκια θερμοκηπίου, Τομάτες, Μελιτζάνες (αγρού και θερμοκηπίου)	1
Καπνός	7
Σιτάρι	28
Βαμβάκι	75

B

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 5078/59875/29-05-2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ