



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22-3-2016
Αριθ.πρωτ: 7886/91127 ΠΕ

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 928 7161
e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr

Προς: Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Σωρού 18-20
Τ.Κ.151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

E-mail: Nikos.tsakalis@bayer.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60.321 οριστικής έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) VOLARE 687,5 SC ως προς το φάσμα δράσης (χρήσεις ήσσονος σημασίας)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
3. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»
5. Την από 21/8/2015 αξιολόγηση του ΜΦΙ
6. Την από 16-11-2015 σχετική εισήγηση της υπηρεσίας
7. Την υπ' αριθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) απόφαση, με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον

Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

8. Την από 19-12--2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **60.321** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος(μυκητοκτόνο) **VOLARE 687,5 SC** (δ.ο. fluopicolide + propanoic acid-hydrochloride), που χορηγήθηκε με την με. αριθ. **6121/63465 /31-5 – 2012** απόφαση μας ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Συγκεκριμένα

Α. Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιαστήματα επεμβάσεων
		Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ.εκ/ στρέμμα		
Πατάτα ¹	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	120-160	100	120-160	Προληπτικές εφαρμογές. Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσβολής. BBCH: 21 - 81	4 / 7-12
Αγγούρι, κολοκύθι, κολοκύθα (υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	120-160	100	120-160	Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσβολής. BBCH: 21 - 83	2 / 7-12
Αγγούρι ² , κολοκύθ (θερμοκηπίου)	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	120-128	100-125	120-160	Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσβολής. BBCH: 21 - 83	3 / 7-12
Πεπόνι, Καρπούζι (υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	140-160	100	140-160	BBCH: 21 - 86	2 / 7-12
Πεπόνι, Καρπούζι (Θ)	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	140-160	100	140-160	BBCH: 21 - 86	3 / 7-12
Μαρούλι (Υ) (ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού)	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>)	140-160	100	140-160	Εφαρμογή μετά το τρίτο πραγματικό φύλλο (BBCH 13)	1 / --
Μαρούλι (Θ) (ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού)	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>)	140-160	100	140-160	BBCH: 13 - 49	1-2/ 7-12

Λάχανο λευκό, Λάχανο κόκκινο, (υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Peronospora</i> spp.)	160	100	160	BBCH: 13 - 49	3 / 7-12
Κουνουπίδι Μπρόκολο	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	160	100	160	BBCH: 13 - 49	1-3 / 7-12
Χρήση ήσσονος σημασίας ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ, ΣΕΛΙΝΟ, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΚΟΡΙΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΗΘΟΣ, ΚΥΜΙΝΟ, ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ, ΘΥΜΑΡΙ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, ΔΥΟΣΜΟΣ, ΜΕΝΤΑ, ΡΙΓΑΝΗ κλπ (Θ)	Περονόσπορος (<i>Plasmopara petroselini</i> , <i>Plasmopara nivea</i>)	140-160	100	140-160	Εφαρμογές μετά το τρίτο πραγματικό φύλλο και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του φυλλώματος	2/7-12
Χρήση ήσσονος σημασίας ΡΟΚΑ (Θ)	Περονόσπορος (<i>Peronospora parasitica</i> (= <i>Hyaloperonospora parasitica</i>), <i>Albugo candida</i>)	140-160	100	140-160	Εφαρμογές μετά την εμφάνιση όλων των πραγματικών φύλλων και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του φυλλώματος	2/7-12
Χρήση ήσσονος σημασίας ΣΠΑΝΑΚΙ (Υ)	Περονόσπορος (<i>Peronospora farinosa</i> f. <i>sp. spinaciae</i>)	140-160	100	140-160	Εφαρμογή μετά την εμφάνιση όλων των πραγματικών φύλλων	1

Παρατηρήσεις:

1. Η δόση των 120 κ.εκ/ στρ. θα πρέπει να εφαρμόζεται προληπτικά ενώ η δόση των 160 κ.εκ/ στρ. θα πρέπει να εφαρμόζεται προληπτικά σε περίπτωση που ο κίνδυνος εμφάνισης της προσβολής είναι υψηλός ή θεραπευτικά στα αρχικά στάδια έναρξης της προσβολής.
2. Για όγκους νερού μεγαλύτερους των 100 λίτρα / στρ, η μέγιστη δόση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 160 κ.εκ/ στρ.

Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αρωματικά φυτά, ρόκα και σπανάκι από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΓΕΡ) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας

Β. Το σημείο 13.2 διαμορφώνεται ως εξής:

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα	7 ημέρες
Αγγούρι, Κολοκύθι(Θ)	1 ημέρα
Αγγούρι, Κολοκύθι, κολοκύθα (Υ)	3 ημέρες
Πεπόνι, Καρπούζι (Υ+Θ)	3 ημέρες
Λάχανο λευκό, Λάχανο κόκκινο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι (Υ)	14 ημέρες
Μαρούλι (ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού) (Θ)	14 ημέρες
Μαρούλι (ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού) (Υ)	7 ημέρες
Αρωματικά φυτά (Θ)	21
Ρόκα (Θ)	21
Σπανάκι (Υ)	14

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό . **6121/63465 /31-5 – 2012** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **60.321** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **VOLARE 687,5 SC** όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΣΤΟΥΠΗΣ