



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 25.04.2019**  
**Αριθ. πρωτ: 4090/83576**

**Ταχ. Δ/νση:** Λ. Συγγρού 150  
**Ταχ. Κώδικας:** 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
**Πληροφορίες:** Κ. Μητσοπούλου  
**Τηλέφωνο:** 210 92 87 165

**Προς:** **SIPCAM OXON, S.P.A.**, Ιταλίας  
 (δια του υπευθύνου επικοινωνίας,  
**SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ**  
 Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ. 19400,  
 Κορωπί)  
**e-mail:** info@sipcam.gr  
 g.vlachou@sipcam.gr

**e-mail:** kmitsopoulou@minagric.gr

**ΘΕΜΑ:**«Τροποποίηση της με αριθμό 14462 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ZIPPY 10 CS (Iambda cyhalothrin 9,53% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)»

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

#### **Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β' /2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 619/46787 (ΦΕΚ 988/Β'/22-03-2019) Απόφαση με θέμα " Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης,

Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων."

7. Τη με αριθ. πρωτ. 3898/42960/12-9-2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14462 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ZIPPY 10 CS (lambda cyhalothrin 9,53% β/ο).
8. Τη με αριθ. πρωτ. 4090/83576/17.04.2019, αίτηση της εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ, ως υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας SIPCAM OXON, S.P.A., Ιταλίας..

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A** Τροποποιούμε την με αριθμό 14462 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ZIPPY 10 CS (lambda cyhalothrin 9,53% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 3898/42960/12-9-2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)

Συγκεκριμένα, το σημείο **5** διαμορφώνεται ως εξής:

#### 5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Σιτάρι (μαλακό & σκληρό) (TRZAX)/ Κριθάρι (HORVX)	Αφίδες <i>Schizaphis graminum</i> (TOXOGR) <i>Macrosiphum avenae</i> (MACSAV) Σκαθάρι του σιταριού <i>Oulema melanopus</i> (LEMAME)	15-20		40-80	Με την εμφάνιση έντονων προσβολών από τέλος του αδελφώματος μέχρι στο γάλα του καρπού	2/14
Αραβόσιτος (ZEAMX)	Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> (PYRUNU), Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp.</i> (SPODSP)	10-25		20-100	Με την εμφάνιση έντονων προσβολών από την προβολή της αρσενικής ταξιανθίας (φούντας) μέχρι του σταδίου της αρχής σκλήρυνσης των σπόρων	2/10

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Πατάτα (SOLTU)	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE)	15-25		50-100	Με την έναρξη της προσβολής και το ξεδίπλωμα των πρώτων φύλλων μέχρι την ωρίμανση	2/14
Πυπεριά (CYPAN), Τομάτα (LYPES), Μελιτζάνα (SOLME) (Υ)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR)	10-25		50-100	Για τις αφίδες με την αύξηση του πληθυσμού τους. Για τους λοιπούς εχθρούς πριν το πρόβλημα καταστεί έντονο	2/7
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά (CIDSΙ), Λεμονιά (CIDLI), Μανταρινιά (CIDRE), Γκρέιπ φρουτ (CIDPA))	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	20-40		150-200	Με την εμφάνιση των προσβολών μετά την άνθιση μέχρι και την ωρίμανση των καρπών	3/7
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά (PRNPS), Νεκταρινιά (PRNPΝ), Βερικοκιά (PRNAR),	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA) Καρπόκαψα <i>Grapholita molesta</i> (LASPMO), <i>Cydia molesta</i> (LAPSMO) Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> (ANARLI)	10-18		100-150	Με την εμφάνιση της προσβολής από του σταδίου της καρπόδεσης μέχρι το μέσον του αναμενόμενου μεγέθους καρπών	2/10

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Δαμασκηλιά (PRNDO)	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA) Καρπόκαψα <i>Grapholita molesta</i> (LASPMO), <i>Cydia molesta</i> (LAPSMO)) Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> (ANARLI)	10-25		100-150	Με την εμφάνιση της προσβολής από του σταδίου της καρπόδεσης μέχρι το μέσον του αναμενόμενου μεγέθους καρπών	3/10
Ακρόδρυα (Φουντουκιά) (CYLAV)	Βρωμούσες <i>Palomena prasina</i> (PALOPR), <i>Gonocerus acuteangulatus</i> (GONRAC)  <b><u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u></b> Καφέ Βρωμούσα* ( <i>Halyomorpha halys</i> ) HALYHA	10-15		70-100	Με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο του καρπιδίου μέχρι την πλήρη ωρίμανση	2/10

## Παρατηρήσεις:

1. Να μην υπερβαίνεται η μέγιστη συνιστώμενη δόση.
2. Η μεγαλύτερη συνιστώμενη δόση να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έντονων προσβολών.
3. \*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος.»

**Β** Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 3898/42960/12-9-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ**

Εισηγητής	Προϊστάμενος		
	Τμήματος	Δ/νσης	Γεν. Δ/νσης