



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 23 - 1 - 2008  
Αριθ. πρωτ: 114750**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 250  
e-mail: [syg036@minagric.gr](mailto:syg036@minagric.gr)**

**ΘΕΜΑ: «Προσωρινή έγκριση διάθεσης στην  
αγορά στο φυτοπροστατευτικό  
προϊόν (μυκητοκτόνο)  
COLLIS 20/10 SC»**

**Προς: BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Αιγιαλείας 48,  
151 25 Μαρούσι, Αθήνα  
(με απόδειξη)**

- Κοιν.:**
- 1. Γραφείο κ. Υπουργού**
  - 2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά**
  - 3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)  
Έδρες τους**
  - 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων**
- Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά**
- 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους**
  - 6. ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα**
  - 7. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/νσής μας  
-Γραμματεία της Δ/νσής μας**
  - 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Διδότου 26, Αθήνα**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 8 παρ. 1 αυτής.
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την ΚΥΑ 118402/26.04.2006 (Β618-18/03/2006) των Υπ. Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα «Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων επί και εντός προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2005/76/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2003, για την δ.ο. Kresoxim-methyl
4. Τη γνωμοδότηση του **Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ** για το 7<sup>ο</sup> θέμα της 4<sup>ης</sup>/2005 Συνεδρίασης του.
5. Την έγκριση του ομοίου σκευάσματος από την Ιταλία.
6. Τις εισηγήσεις των ομάδων ελέγχου (Χημικού , Τοξικολογικού, Βιολογικού Υπολειμμάτων, Τύχης και Συμπεριφοράς στο Περιβάλλον και Οικοτοξικολογικού).
7. Το Π.Δ. 206/2007, Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 232<sup>Α</sup>/19.9.2007)
8. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊστάμενους Διεύθυνσης και Προϊστάμενους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».
9. Τις με αριθ. πρωτ 129108/5-12-2005, και 123156/16-10-2007 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 8 παρ.1, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **COLLIS 20/10 SC** με τα ακόλουθα στοιχεία:

### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

#### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

**60.136**

**23-1-2008**

**23-1-2011**

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή:

**COLLIS**

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

#### **1.3 Δραστικές ουσίες**

α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά ISO

Boscalid  
Kresoxim-methyl

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Boscalid 96 % (β/β) min  
Kresoxim-methyl 91 %  
(β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

**Boscalid , Kresoxim-methyl:**  
BASF Aktiengesellschaft, Crop Protection  
Division, P.O.  
Box 120, D-67114 Limburgerhof, Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

**Boscalid:**  
BASF S/A, Βραζιλία.

**Kresoxim-methyl:** BASF Española  
S.A., Ισπανία

(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα I της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών boscalid και kresoxim-methyl όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 22-9-2003 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 111654) και τροποποιήθηκαν μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Αρχής με ημερομηνία 5-11-07.(Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ 123785.) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
ΑΜΕ: BASGR  
Αιγιαλείας 48,  
151 25 Μαρούσι, Αθήνα  
Τηλ.: 210-6860100  
Fax: 210-6860200  
E-mail: maria.tsinou@basf.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF Aktiengesellschaft, Crop Protection Division, P.O. Box 120, D-67114 Limburgerhof, Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
BASF Española S.A., Ισπανία  
  
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

Δ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,  
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Boscalid 20 % (β/ο),  
Kresoxim-methyl 10 % (β/ο)  
Βοηθητικές ουσίες 71.07 % β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση με ημερομηνία 8-11-2007 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 123888) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

**2**

## Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	80 κ.εκ., 100 κ.εκ., 150 κ.εκ., 200 κ.εκ., 250 κ.εκ., 300 κ.εκ., 400 κ.εκ., 500 κ.εκ.	HDPE
2.	Δοχεία	1 λίτρου, 5 λίτρων, 10 λίτρων	HDPE

**3**

### Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες

**Τρόπος εφαρμογής:** Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Με άφθονο νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Το προϊόν εξουδετερώνεται με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες για αγροχημικά (περίπου 1100°C για 2 δευτερόλεπτα).

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το COLLIS είναι μυκητοκτόνο μίγμα δύο δραστικών συστατικών, kresoxim-methyl και boscalid, με παρόμοιο τρόπο δράσης για την καταπολέμηση του Ωιδίου. Το kresoxim-methyl παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή (κυτόχρωμα bc1) και εμφανίζει διελασματική κίνηση, ενώ το boscalid επίσης εμποδίζει την κυτταρική αναπνοή, αλλά σε διαφορετική θέση δράσης και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση. Το COLLIS παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση εμφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		ml./ στρέμμα (max)	ml./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι	Ωίδιο ( <i>Uncinula necator</i> )	40	40	100	Προληπτικοί ψεκασμοί από την έναρξη της άνθησης μέχρι το κλείσιμο των σταφυλιών σε διαστήματα των 10 -14 ημερών	3
Αγγούρι, Κολοκύθι (θερμοκήπιο, αγρός)	Ωίδιο ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	40-50	40-50*	100	Έναρξη ψεκασμών με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες.	3
Πεπόνι, Καρπούζι (αγρός)	Ωίδιο ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	40-50	40-50*	100	Έναρξη ψεκασμών με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες.	3

**Παρατήρηση:** \* Η μεγαλύτερη δόση και το μικρότερο μεσοδιάστημα πρέπει να εφαρμόζονται όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης ή εξέλιξης της ασθένειας

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση ανθεκτικότητας**

- Εφαρμόστε το COLLIS, προληπτικά με την έναρξη της ασθένειας και όχι θεραπευτικά
- Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη από τον παρασκευαστή δόση
- Εφαρμόστε το COLLIS σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από διαφορετικές ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης
- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 3, με όχι περισσότερες από 2 συνεχόμενες εφαρμογές

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-  
τατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.  
Στο αμπέλι να μην συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν chlorpyrifos και chlorpyrifos methyl.  
Στο αγγούρι και κολοκύθι θερμοκηπίου να μην συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν pyriproxifen, pymetrozine και cyromazine, σε ψεκασμούς φυλλώματος, ενδέχεται να προκληθεί περιφερειακή νέκρωση των νεαρών φύλλων.  
Σε κάθε άλλη περίπτωση συνδυασμού στο βυτίο με περισσότερα του ενός φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή προσθήκης προϊόντων θρέψης σε πολλαπλούς συνδυασμούς να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση.

**9** Σήμανση σκευάσματος:

**Xn** – Επιβλαβές,  
**N** – Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

**10** Φράσεις R

**R 40** – Ύποπτο καρκινογένεσης.

**R 50/53** – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**11** Φράσεις S

**S 1/2** – Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**S 13** - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

**S 20/21** - Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

**S 36/37** – Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

**S 46** - Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

**S61** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένου ασφαλείας

**SP1** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του

**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τα επιφανειακά ύδατα.

Μην εισέρχετε στις ψεκασμένες καλλιέργειες πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης



**12** Πρώτες βοήθειες  
- Αντίδοτο

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ**

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύντε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν συμβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μην δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Μέγιστα Όρια  
Υπολειμμάτων  
(MRLs)

Kresoxim-methyl:

Boscalid:

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν οριστεί κοινοτικά MRL's με την ΚΥΑ 118402/26.04.2006 (B618-18/03/2006)	
<b>Σταφύλια</b> (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα)	<b>1</b>
(με εδώδιμο φλοιό και μη εδώδιμο φλοιό ) Αγγούρι Κολοκυθι Πεπόνι Καρπούζι	<b>0,2</b>

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Σταφύλια	35
Αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι	3

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες από  $-5^{\circ}\text{C}$  έως  $30^{\circ}\text{C}$ .

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



**Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ**

## Δ – 7 (GAP)

### ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)

: Boscalid

Σελίδες :

Kresoxim-methyl

EEC No (α)

:

Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

COLLIS

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

Μυκητοκτόνο

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσμα- τος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
(α)			(β)	(γ)	Μορφή	Περιε- κ σε δ.ο.  (θ)	Μέθοδος/ τρόπος  (στ-η)	Στάδιο Ανάπτυ- ξης και εποχή  (ι)	Αριθμός Εφαρμογ- ών Ελάχ. Μεγ.  (κ)	χρονικό μεσοδιάστη- μα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	gr δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.	gr. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)	Ελλάς	COLLIS	A	Ωίδιο	SC	200/ 100 g/l	Ψεκασμός φυλλώματος	BBCH 16-79	3	10	8/4	1000	80/40	3	
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό, Αγγούρι κολοκύθι	Ελλάς	COLLIS	A	Ωίδιο	SC	200/ 100 g/l	Ψεκασμός φυλλώματος	BBCH 15-88	3	10	8/4 - 10/5	1000	80/40 - 100/50	3	
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό, Πεπόνι, Καρπούζι	Ελλάς	COLLIS	A	Ωίδιο	SC	200/ 100 g/l	Ψεκασμός φυλλώματος	BBCH 15-88	3	10	8/4 - 10/5	1000	80/40 - 100/50	3	

χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).

(θ) g/kg ή g/lit

- (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ). (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth  
(γ) πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έτομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια Stages of Prants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου  
(δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC) βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής  
(ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989. (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες  
(στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή  
(ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκάσμος υψηλού όγκου, σκονισμός